

Вселенная пространство • время

Рентгеновская
Вселенная
телескопа
ХММ-Newton

Китайский
луноход:
начало пути

УДАРЫ
СТИХИИ
*Итоги
ушедшего
года*

ЭКСКЛЮЗИВ
Леон Розенблум

7 полетов
Джерри Росса


Телескоп
Gaia
отправился
в космос

Hubble
изучает
Европу

МКС:
будни 38-й
экспедиции


ASG
AUTO STANDARD GROUP

www.universemagazine.com



4 820094 200010 00114

Robonaut 2 — один из андроидов, трудящихся в настоящее время на орбите. Он учится выполнять все большее количество механических операций. Его возможности заметно расширяются после того, как к его торсу с руками и головой приделают ноги (стр. 21).

СОДЕРЖАНИЕ

Январь 2014

ВСЕЛЕННАЯ

Космические телескопы.
Часть VII. Рентгеновский
диапазон. XMM-Newton

4

Новости

Gaia отправилась
в космос

11

Chandra «видит» джет
черной дыры

21

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Новости

Глинистые минералы на льду
Европы

14

Водяные шлейфы в системе
Юпитера

15

«Белый заяц» прилунился

16

«Чанъэ-2»: китайский рекорд
 дальности

17

WISE вернулся к наблюдениям

18

КОСМОНАВТИКА

Новости

Стартовал «Прогресс М-21М»

19

Cygnus: старт отложен

19

Mars One: на шаг ближе
к реальности

20

Иран запустил в космос вторую
обезьяну

20

Запущены европейские
спутники

20

Неудачный запуск китайско-
бразильского спутника

21

Космическому роботу
«сделают ноги»

21

ТЕМА НОМЕРА

7 полетов Джерри Росса
Леон Розенблум

22

КНИГИ

32

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АСТРОНОМИЯ

Небесные события февраля

34

ЗЕМЛЯ

Стихийные бедствия
минувшего года

38



КНИГИ! Подробнее на стр. 32-33

Руководитель проекта,
главный редактор:
Гордиенко С.П., к.т.н.
(киевская редакция)

Главный редактор:
Остапенко А.Ю.
(московская редакция)

Заместитель главного редактора:
Манько В.А.

Редакторы:
Рогозин Д.А., Ковальчук Г.У.

Редакционный совет:

Андронов И. Л. – декан факультета
Одесского национального морского
университета, доктор ф.-м. наук, про-
фессор, вице-президент Украинской
ассоциации любителей астрономии

Вавилова И.Б. – учений секретарь Со-
вета по космическим исследованиям
НАН Украины, вице-президент

Украинской астрономической ассоциа-
ции, кандидат ф.-м. наук

Митрахов Н.А. – Президент информаци-
онно-аналитического центра Спейс-
Информ, директор информационного
комитета Аэрокосмического общества
Украины, к.т.н.

Олейник И.И. – генерал-полковник,
доктор технических наук, заслуженный
деятель науки и техники РФ

Рябов М.И. – старший научный
сотрудник Одесской обсерватории
радиоастрономического института
НАН Украины, кандидат ф.-м. наук,
сопредседатель Международного
астрономического общества

Черепашук А.М. – директор Государ-
ственного астрономического института
им. Штернберга (ГАИШ), академик РАН
Чурюмов К.И. – член-корреспондент

НАН Украины, доктор ф.-м. наук,
профессор Киевского национального
Университета им. Т. Шевченко

Бордюленко А.С. – Президент группы
компаний «AutoStandardGroup»

Дизайн, компьютерная верстка:
Галушка С.М.

Художник: Полов В.С.

Отдел продаж: Малакович Евгений

тел.: (067) 370-60-39

Адреса редакции:

02152, Киев,

ул. Днепровская набережная, 1A,

оф.146.

тел.: (044) 295-02-77

тел./факс: (044) 295-00-22

e-mail:

uvrcev@gmail.com

info@universemagazine.com

www.universemagazine.com

123056, Москва,
пер. М. Тишинский, 14/16.
тел.: (499) 253-79-98,
(495) 544-71-57

Распространяется по Украине
и в странах СНГ

В рознице цена свободная

Подписные индексы

Украина: 91147

Россия:

12908 – в каталоге

«Пресса России»

24524 – в каталоге

«Почта России»

Учредитель и издатель

ЧП «Третья планета»

© ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время –

№1 январь 2014

Зарегистрировано Государственным

комитетом телевидения

и радиовещания Украины.

Свидетельство КВ 7947
от 06.10.2003 г.

Тираж 8000 экз.

Ответственность за достоверность
фактов в публикуемых материалах
несут авторы статей

Ответственность за достоверность
информации в рекламе несет рекла-
модатели

Перепечатка или иное использование
материалов допускается только
с письменного согласия редакции.

При цитировании ссылка на журнал
обязательна.

Формат – 60x90/8

Отпечатано в типографии

ООО «Слон»,

Киев, ул. Бориспольская, 9.

т. (044) 592-35-06



ВСЕЛЕННАЯ,
пространство, время —
международный научно-
популярный журнал по
астрономии и космонавтике,
рассчитанный на массового
читателя

Издается при поддержке
Национальной
академии наук Украины,
Государственного
космического агентства
Украины, Международного
Евразийского
астрономического
общества, Украинской
астрономической
ассоциации,
Информационно-
аналитического центра
«Спейс-Информ»,
Аэрокосмического
общества Украины
Подписные индексы:
Украина: 91147
Россия:
12908 – в каталоге
«Пресса России»
24524 – в каталоге
«Почта России»

Свидетельство КВ 7947
от 06.10.2003 г.
Тираж 8000 экз.
Ответственность за достоверность
фактов в публикуемых материалах
несут авторы статей
Ответственность за достоверность
информации в рекламе несет рекла-
модатели
Перепечатка или иное использование
материалов допускается только
с письменного согласия редакции.
При цитировании ссылка на журнал
обязательна.
Формат – 60x90/8
Отпечатано в типографии
ООО «Слон»,
Киев, ул. Бориспольская, 9.
т. (044) 592-35-06



С помощью космических телескопов можно увидеть множество интереснейших явлений, скрытых от наземных наблюдателей атмосферным занавесом и недоступных невооруженному глазу.

Космические телескопы

Часть VII

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАПАЗОН

XMM-Newton

Первые же результаты, полученные рентгеновской обсерваторией Chandra,¹ весьма впечатлили научное сообщество. Еще один подобный проект вышел на стадию запуска менее чем через полгода: 10 декабря 1999 г. на высокоэллиптическую околоземную орбиту высотой 7–114 тыс. км и периодом обращения 48 часов был выведен космический телескоп XMM-Newton (X-ray Multi-Mirror Mission — рентгеновская многозеркальная миссия), созданный Европейским космическим агентством (ESA) совместно с NASA. Перечень его задач был примерно таким же, как у Chandra, однако благодаря более высокой чувствительности и меньшему эквивалентному фокусу он предоставил ученым возможность «взглянуть» на изучаемые объекты в несколько ином ракурсе.

Европейский рентгеновский телескоп

Телескоп XMM-Newton ведет наблюдения практически всех астрономических объектов — от комет и планет нашей

Солнечной системы до самых далеких квазаров, освещавших Вселенную 13 млрд лет назад. Приборы обсерватории регистрируют их изображения одновременно в нескольких диапазонах спектра, позволяя получать о них всеобъемлющую информацию.

На борту XMM-Newton установлены три рентгеновских те-

лескопа диаметром 30 см, каждый из которых имеет 58 концентрических зеркал, «вложенных» одно в другое.

В первичном фокусе каждого из телескопов, за турелью с шестью фильтрами, расположена фотон-регистрирующая камера EPIC (Photon Imaging Camera). Ее кремниевые чипы чувствитель-

ны к чрезвычайно слабому рентгеновскому излучению и обнаруживают быстрые изменения его интенсивности — вплоть до тысячной доли секунды. В состав EPIC также входит система радиационного мониторинга (ERMS), работающая в режиме детектора частиц и измеряющая уровень радиации во время



ESA/Herschel/PACS/SPIRE/J. Fritz, U. Gent; X-ray: ESA/XMM-Newton/EPIC/WME; optical: R. Gendler


▲ Туманность Андромеды — ближайшая спиральная галактика, крупнейший член Местной Группы (ВПВ №6, 2007, стр. 4). В ее состав входит несколько сотен миллиардов звезд. Изображения, полученные в различных спектральных диапазонах, показывают звездные популяции, находящиеся на разных стадиях своего жизненного цикла. Инфракрасный снимок телескопа Herschel (ВПВ №4, 2013, стр. 10) отображает области концентрации холодной пыли, сопутствующей газовым облакам, в которых идет формирование новых светил. Фотографии в видимом диапазоне демонстрируют «взрослые» звезды. Рентгеновские снимки обсерватории XMM-Newton запечатлели драматические финалы звездной эволюции, сопровождающиеся взрывами сверхновых и образованием сверхплотных объектов — нейтронных звезд, черных дыр.

¹ ВПВ №11, 2013, стр. 4

Космический телескоп XMM-Newton (иллюстрация).



From the VILSPA
XMM-Newton Science
Operations Center,
courtesy of Dornier
Satellitensysteme GmbH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса: 3800 кг
- Длина: 10 м
- Площадь собирающей поверхности: 4300 см²
- Фокусное расстояние: 7,5 м

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ:

- Обнаружение рентгеновского излучения тел Солнечной системы
- Изучение областей активного звездообразования
- Изучение процессов формирования и эволюции скоплений галактик
- Наблюдение окрестностей сверх массивных черных дыр

➤ солнечных вспышек либо при прохождении аппарата через радиационные пояса Земли.

Для проведения спектрального анализа принятого излучения два из трех телескопов на зеркалах имеют отражательный дифракционный спектрометр (Reflection Grating Spectrometer – RGS), отражающий около 40% входящих лучей во второй фокус с собственной ПЗС-камерой. Этот инструмент может работать в любом из выбранных участков спектра, что дает возможность более детально исследовать спектральные интервалы, содержащие интересные характеристические линии химических элементов — в частности, кислорода и железа.

Третий инструмент на борту XMM-Newton — обычный, но очень чувствительный телескоп видимого и ультрафиолетового диапазона (так называемый «оптический монитор»). Он наблюдает те же области неба, что и два остальных телескопа, предоставляя астрономам дополнительные данные о рентгеновских источниках и позволяя уточнить их идентификацию. Длина этого инструмента составляет 2 м, диаметр объектива — 30 см. Он обладает такой же чувстви-

тельностью, как наземные телескопы с диаметром зеркала 4 м.

Обзор неба и «глубокий» снимок


По состоянию на начало 2013 г. список опубликованных работ по материалам наблюдений на телескопе XMM-Newton насчитывает более двухсот позиций.

Команда космической обсерватории решила максимально эффективно использовать мощный потенциал аппарата, работая в режиме «не терять ни секунды». При перемещении от одной це-

ли к другой телескоп продолжал фиксировать попадающие в поле зрения небесные тела. За последние 4 года «в свободное от работы времени» ему удалось отснять 25% всего неба! Сделанный таким образом дополнительный обзор включает в себя тысячи рентгеновских источников, многие из которых открыты впервые.


Перемещаясь от объекта к объекту, космический аппарат просматривает своеобразные «дорожки» — они представлены на итоговом изображении оранжевыми линиями. К настоящему времени ими покрыто порядка 62% неба.

Полученная панorama представляет собой мозаику, состоящую из 73178 отдельных изображений 1×0,5°. Самой примечательной особенностью галактической плоскости является остаток сверхновой в созвездии Парусов (яркое пятно в правой части изображения). В противоположной стороне, левее центра Галактики, видна туманность Петля Лебедя, образовавшаяся после взрыва сверхновой 5–8 тыс. лет назад. Выше центра изображения различим мощный рентгеновский источник, известный как Скорпион X-1 —



▲ Обзор неба, выполненный телескопом XMM-Newton. На этом рисунке отображены около тысячи проходов (сканов) поля зрения космического телескопа при проведении плановых наблюдений.

▼ Так в представлении художника выглядит магнетар SGR 0418+5729.



«засияла» в рентгеновском диапазоне, чего не наблюдалось в предыдущие десятилетия.

Оказалось, что галактика стала заметной в рентгене из-за того, что сверхмассивная ЧД в ее центре захватила и разорвала на части небольшой относительно холодный объект. По оценкам астрономов, его масса в 14–30 раз превышала юпитерианскую, что позволяет считать его крупным «горячим юпитером» или небольшим

коричневым карликом.

Благодаря космическому телескопу XMM-Newton также открыт объект с одним из самых сильных магнитных полей во Вселенной — магнетар SGR 0418+5729, представляющий собой особый, весьма редкий вид нейтронных звезд. Напряженность магнитного поля в отдельных компактных областях на поверхности звезды (размером порядка сотен метров) достигает 10^{15} гауссов,

но в глобальном масштабе оно практически не проявляется. Проведенные исследования подтвердили, что здесь ученые имеют дело с самыми большими среди когда-либо измеренных значений магнитной индукции во Вселенной.

Рентгеновский телескоп Chandra обнаружил так называемый ультраяркий источник рентгеновского излучения (ULX)² в M31 в конце 2009 г. Анализ полученных данных, проведенный международной группой ученых, говорит о том, что это мощное излучение представляет собой результат «деятельности» массивной ЧД.

В настоящее время общепринятой точкой зрения считается предположение о том, что в каждой из галактик во Вселенной должны быть черные дыры, причем в их центрах — обязательно. Быстро поглощая окружающие газ и пыль, они образуют аккреционные диски, которые нагреваются и испускают рентгеновское излучение. Это и есть


ULX, замеченный в спиральной галактике Андромеды. Он оказался ближайшим к нам — расстояние до него составляет около 2,5 млн световых лет.

ULX — пока еще довольно экзотическое и малоизученное явление. Скорее всего, в некоторых случаях они связаны с «нормальными» ЧД, возникшими после гибели массивных звезд (с массами в пределах 1–5 солнечных). Другие астрономы предпочитают «не мелочиться», предполагая, что в процессах участвуют объекты в тысячи раз тяжелее Солнца, возникшие в результате слияния множества ЧД звездных масс.


Теория образования черных дыр предсказывает, что их излучение не может наблюдаться, так как оно удерживается мощнейшей гравитацией, поэтому такие космические объекты можно обнаружить либо по их тяготению, либо по излучению газа, падающего на них извне. Команда ученых из Университета штата Мэриленд не согласилась со столь беспамятническим утверждением и сумела определить ско-

² ВПН №7, 2005, стр. 6

▼ Так выглядят рентгеновские источники в Туманности Андромеды для орбитального телескопа Swift, также способного вести съемку в рентгеновском диапазоне. Первый из них, обозначенный CXOM31 J004253.1+411422, был открыт телескопом Chandra (NASA) 17 декабря 2009 г. и представляет собой, скорее всего, черную дыру звездной массы. Второй — XMMU J004243.6+412519 — обнаружен меньше года назад (15 января 2013 г.) европейским спутником XMM-Newton. Его открытие сняло существовавший ранее парадокс «отсутствия» ULX в галактике M31, которое астрономы пытались объяснить тем, что подобные объекты не образуются в «спокойных» старых спиральных галактиках (таких, как Туманность Андромеды и наш Млечный Путь).



▲ На этом снимке, сделанном в видимом диапазоне, показано расположение двух ультраярких рентгеновских источников в галактике M31 (Туманности Андромеды).




рость вращения ЧД, совсем не покушаясь на догмы теории относительности Эйнштейна.

Инструментом для изучения поведения загадочного небесного тела стал рентгеновский телескоп XMM-Newton, который сумел получить уникальный наблюдательный материал для исследования диска, окружающего сверхмассивный объект в центре галактики MCG-06-30-15. Оказалось, что этот диск вращается с огромной скоростью, поэтому излучение, исходящее от него, подвержено релятивистским эффектам (возникающим при скоростях частиц, сравнимых со скоростью света), благодаря чему можно определить и скорость вращения самой ЧД. По расчетам ученых, она вращается со скоростью 98,7% от максимально допустимой теорией Эйнштейна. Скорость зависит от того, формировалась ли ЧД в одиночку или же возникла при слиянии двух компактных объектов. В первом случае ее вращение со временем будет ускоряться до достижения релятивистского предела, во втором случае оно окажется более медленным.

Сталкивающиеся галактики

Считается, что при слиянии галактик столкновения отдельных звезд, входящих в их состав, крайне маловероятны из-за огромных расстояний между ними по сравнению с их размерами. Однако, когда вопрос касается взаимодействия газовых компонент, ситуация представляется несколько иной — тем более, когда речь заходит о газово-пылевых облаках, в которых постоянно формируются звезды. Чтобы разобраться с этими непростыми явлениями, в 2007 г. с помощью космического телескопа Hubble³ было получено изображение ближайшей пары сливавшихся галактик NGC 2623 с высоким разрешением. Кроме того, к исследованию присоединились данные наблюдений



▲ Ученые предполагают, что голубой цвет планеты HD 189733b может быть связан с регулярно идущими на ней дождями из расплавленного стекла. Эти выводы базируются на наблюдениях ее прохождений по диску центральной звезды в рентгеновском диапазоне, проведенных телескопами Chandra и XMM-Newton: оказалось, что в этом диапазоне размер планетной атмосферы почти втрое больше, чем в видимых лучах. Вдобавок выяснилось, что скорость ее утечки в космос может достигать 600 тыс. тонн в секунду.

в инфракрасном диапазоне (телескоп Spitzer⁴) и в рентгеновских лучах (XMM-Newton), а также ультрафиолетовые снимки телескопа GALEX.⁵ В результате такого комплексного подхода стало ясно, что в слиянии участвуют две спиральные галактики, которые уже «спелись» друг с другом. «Объединительный» процесс наблюдается на стадии соединения ядер и образования одного общего ядра, весьма активного. Новые звезды формируются непосредственно вокруг него, вдоль вытянутых в разные стороны «хвостов», рожденных приливными воздействиями, и, как ни странно, в области рядом с ядром, где видны яркие голубые звезды молодых скоплений. Напомним, что существующие теории пред-

полагают наличие областей активного звездообразования преимущественно на окраинах галактик.

Процесс слияния может продолжаться сотни миллионов лет и проходить несколько стадий. Протяженность NGC 2623 составляет 50 тыс. световых лет, система находится в 250 млн световых лет от Солнца в созвездии Рака. Установить, какими изначально были сталкивающиеся галактики, и понять, как протекает их слияние, зачастую довольно сложно, а порой невозможно. Однако это очень важно для понимания эволюции нашей Вселенной.

Экзопланета в рентгеновском диапазоне


В июле 2013 г. сотрудники NASA сообщили, что им впервые удалось зарегистрири-

ровать транзит экзопланеты HD 189733b по диску материнской звезды в рентгеновских лучах. Этот известный объект, относящийся к классу «горячих Юпитеров»,⁶ имеет очень высокую температуру и постоянно теряет вещество в форме раскаленного газа. Размер облака этого газа, «тянущегося» за планетой, намного превышает ее диаметр, что и было доказано благодаря анализу наблюдений телескопа XMM-Newton: падение яркости звезды в рентгеновском диапазоне при прохождении планетоподобного спутника по ее диску втрое превышало уменьшение ее блеска в видимом диапазоне. Судя по всему, в самых верхних слоях планетной атмосферы присутствуют некие специфические вещества, почти прозрачные

³ ВПВ №10, 2008, стр. 4; №2-3, 2013, стр. 5

⁴ ВПВ №8, 2013, стр. 4

⁵ ВПВ №11, 2005, стр. 14



▲ Карта неба в галактических координатах с нанесенными на нее объектами,ключенными в каталог 3XMM-DR4 (XMM-Newton Serendipitous Source Catalogue). На врезке показан увеличенный вид небольшой области, на которой приведены отдельные каталогизированные источники. Они были зарегистрированы и идентифицированы на снимках камер EPIC, сделанных с различными целями в ходе 12-летних наблюдений.

для видимого света, но поглощающие излучение более коротковолновых диапазонов.

* * *

«Финальным аккордом» 12-летней работы космического телескопа XMM-Newton на

околоземной орбите стал опубликованный 23 июля 2013 г. шестой выпуск каталога 3XMM-DR4, в который были включены результаты, полученные в период с февраля 2000 г. по декабрь 2012 г. В каждом из 600-700 ежегодных наблюдений, кроме

целевого объекта, обычно занимающего лишь небольшую часть поля зрения, присутствует в среднем около 70 дополнительных. Каталог содержит 531 261 источник рентгеновского излучения, из них 372 728 уникальных — ядер активных га-

лактик (Active galactic nucleus — AGN)⁷, галактических скоплений, взаимодействующих компактных двойных звезд, черных дыр, активных звездных корон (Active stellar coronae — ASC).

⁷ ВПН №6, 2010, стр. 4

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-ПЛАКАТ НА 2014 ГОД

Принимаем заказы!

Выбор из 13 изображений

• Размер 42x59,4 см • Описание объекта



01. Туманность Киля
02. Столбы газа и пыли в туманности Киля
03. Галактика «Сомбреро»

04. Омега Центавра
05. Туманность «Бабочка»
06. Туманность «Улитка»
07. Туманность Андромеды
08. Эмиссионная туманность NGC 602
09. Крабовидная туманность
10. Туманность «Конская Голова»
11. Туманность «Фея»
12. Большая Туманность Ориона
13. Сталкивающиеся галактики

WWW.SHOP.UNIVERSEMAGAZINE.COM

СОБЕРИТЕ ПОЛНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ЖУРНАЛОВ
«ВСЕЛЕННАЯ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ»

В 113 изданных номерах
ежемесячного научно-популярного
журнала опубликовано
415 авторских статей
и обзоров, 51 научно-
фантастический
рассказ, более
2000 новостей



Gaia отправилась в космос

Скосмодрома Куру во Французской Гвиане после месячной отсрочки стартовала ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с европейским космическим телескопом Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics). Пуск состоялся 19 декабря 2013 г. в 09:12 UTC. Это был второй старт российского носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру в 2013 г. и шестой — в рамках проекта «Союз» в Гвианском космическом центре.¹

Первоначально запуск Gaia планировали осуществить 20 ноября. Однако специалистам Европейского космического агентства (ESA) потребовалось дополнительное время для проверки некоторых электронных схем космического телескопа — как выяснилось, на других аппаратах эти элементы слишком быстро деградировали. Следующее стартовое «окно» открылось 17 декабря 2013 г.

Примерно через месяц после запуска Gaia должна выйти в окрестности второй точки Лагранжа (L_2) системы «Земля-Солнце», которая находится на расстоянии около 1,5 млн км от Земли в противосолнечном направлении. В конструкции космического аппарата предусмотрено пассивное средство тепло- и светозащиты его приборов — раскрывающийся экран в виде большого 12-секционного зонта площадью около 100 м², до прибытия в точку Лагранжа остающийся в сложенном состоянии. После выхода на рабочую орбиту все 12 сложенных лепестков «зонта-экрана» должны раскрыться, образовав при этом плоский отражающий диск. Это позволит защитить бортовое оборудование от воздействия Солнца и поддерживать температуру научно-исследовательских приборов на нужном уровне.

Миссия Gaia задумывалась как продолжение проекта Hipparcos. Как и его предшественник, этот космический телескоп будет работать в оптическом диапазоне и предназначается для высокоточных измерений координат и собственных движений миллиарда звезд нашей Галактики с последующим созданием нового фундаментального звездного каталога и трехмерной карты нашей звездной системы. Это, в частности, позволит проверить гипотезу о том, что Млечный Путь возник при слиянии множества мелких галактик. Помимо этого, телескоп должен открыть около 10 тыс. экзопланет, а также вести поиск астероидов и комет в Солнечной системе.

¹ ВПВ №11, 2011, стр. 23

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с космическим телескопом Gaia стартует из Европейского пускового центра во Французской Гвиане 19 декабря 2013 г.

ESA/S. Corvaja, 2013




Фактически Gaia — не один, а целых два телескопа, оптические оси которых наклонены под углом 106,5°. По мере вращения аппарата вокруг своей оси каждый телескоп будет сканировать узкую полоску небесной сферы. Медленный поворот (прецессия) оси вращения позволит в итоге осмотреть все небо, при этом за пять лет работы обсерватория пришлет на Землю больше фотографий, чем орбитальный телескоп Hubble за 21 год работы. За это время каждую из рассматриваемых звезд планируют запечатлеть на 70 снимках. Ежедневно с помощью антенны X-диапазона Gaia будет передавать на Землю по 50 гигабайт данных со скоростью 10 Мбит/с.

На борту аппарата установлен фотографический сенсор с беспрецедентно высокой разрешающей способностью, способный разглядеть прядь волос на расстоянии в 700 км. Приемник излучения размерами 0,5×1 м состоит из 106 ПЗС-матриц, каждая из которых имеет размер 4,7×6 см и вмещает 8,85 млн пикселей. Это крупнейший инструмент для регистрации фотонов, когда-либо отправлявшийся в космос.²

Для стабилизации положения телескопа в пространстве будет использоваться инновационная система реактивных микродвигателей, работающих на холодном азоте, что позволит производить наведение с необходимой степенью точности и избежать нежелательных вибраций, вызываемых гироскопами (использующимися в системах ориентации других автоматических аппаратов).


Панели солнечных батарей телескопа Gaia смогут обеспечить выходную мощность свыше 1,8 кВт для энергопитания систем терморегулирования и ориентации, устройств обработки данных, а также бортового компьютера.

² Общее число рабочих пикселей детекторов обсерватории Gaia равно 938 млн. Предыдущий рекорд (95 млн) принадлежал космическому телескопу Kepler — ВПВ №3, 2009, стр. 13; №2-3, 2013, стр. 12



▲ Светоотражающий экран DSA (Deployable Sunshield Assembly) космического аппарата Gaia во время испытаний механизма развертывания в сборочном ангаре S1B космодрома Куру (Французская Гвиана) 10 октября 2013 г.

Телескоп Gaia в точке Лагранжа на фоне Млечного Пути (иллюстрация).



ESA/ATG medialab; background image: ESO/S. Brunier

Для сравнения: предыдущий европейский аппарат, выполнивший похожую миссию — телескоп Hipparcos, запущенный в 1989 г. — в течение четырех лет собрал подробные данные для 118 тыс. звезд, и еще для 2 млн с менее высокой точностью. Созданные на основе этой информации базы астрометрических данных до сих пор служат важным ресурсом для астрономических исследований.

Gaia поднимет качество этой информации на новый уровень. Его шестигранная оптическая система поперечником 3 м в сочетании с более совершенной приемной аппаратурой обеспечивает в 200 раз большую чувствительность, чем имел Hipparcos. «Если Hipparcos был способен измерить рост астронавта, стоящего на Луне, то Gaia разглядит даже ноготь на его пальце», — не без гордости пишут специалисты ESA.

Прежде недостижимая точность измерения параллаксов (смещения видимого положения звезд при наблюдениях из разных точек земной орбиты, обратно пропорционального их удаленности), а также собственных движений и радиальных скоростей приблизительно миллиарда звезд поможет астрономам получить более четкую картину структуры и эволюции Млечного Пути. Радиальная скорость звезд будет измеряться с помощью спектрометра, также установленного на борту Gaia.

Создатели телескопа уверены, что он сможет измерить положение звезд от 5-й до 15-й звездной величины с точностью до 25 микросекунд дуги и даже выше. Для самых слабых звезд (15-20m) точность будет заметно меньше — около 300 угловых микросекунд. С целью достижения такой точности, в частности, предполагается производить многократное фотографирование уже отснятых звезд. Запланированы также сверхточные измерения их блеска в спектральном диапазоне от ближнего ультрафиолетового до инфракрасного, что позволит в дальнейшем вести поиск экзопланет.

- Разработка миссии Gaia заняла 13 лет и обошлась в 740 млн евро, ее стоимость с учетом пусковых услуг достигла 940 млн евро. Проектный срок функционирования аппарата должен составить не менее пяти лет.

Ключевой задачей телескопа станет проведение наблюдений, которые лягут в основу новой, самой точной и масштабной трехмерной карты нашей Галактики. Считается, что он сможет провести «перепись» примерно миллиарда звезд Млечного Пути — то есть около 1% звезд, входящих в его состав. Для каждой из них Gaia измерит точное расстояние, а также скорость и направление движения. Первых результатов этой работы астрономы ждут уже через два года.

Модель Boeing 747-100 «First Flight» в разрезе

Инновационный проект «Cutaway» компании Dragon включает в себя модель самолета Boeing 747-100. Этот первый широкофюзеляжный пассажирский самолет, известный также как Jumbo Jet, является одним из наиболее узнаваемых самолетов в мире. Некоторые секции модели выполнены прозрачными, что позволяет увидеть сидения внутри фюзеляжа, а также кабину летчиков, крылья и двигатели в разрезе. Эта модель — точная копия оригинала в масштабе 1/144.

www.shop.universemagazine.com



PROJECT CUTAWAY
BOEING DRAGON

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
www.shop.universemagazine.com

Первыми узнавайте новости
на нашем сайте
Коллекция ретрономеров
2008-2012 гг.
в папках на кнопке

Соберите полную коллекцию журналов
Скоро! Коллекции за 2007 и 2013 гг.




Chandra «видит» джет черной дыры

Астрономы уже давно пытаются найти убедительные доказательства наличия в Млечном Пути релятивистских выбросов (джетов) высокозергетических частиц, исходящих из сверхмассивной черной дыры в его центре,¹ известной как радиоисточник Стрелец А* (Sgr A*). Разговоры об их существовании долгое время не выходили за рамки чистого теоретизирования, однако объединенными усилиями орбитальной рентгеновской обсерватории Chandra² и наземного радиоинтерферометра VLA (Very Large Array — Очень большой антенный массив)³ эта проблема была успешно решена.

Ранее исследователи, работавшие на различных телескопах, не единожды успешно анонсировали открытие джетов (точнее, одного джета, лежащего ближе к направлению на Солнечную систему), но все эти заявления — особенно в части, касающейся ориентации «подозрительного» выброса — часто противоречили друг другу.

Струи частиц высоких энергий — обычное явление во Вселенной, непременно сопровождающее сверхплотные космические объекты. Джеты также формируются рождающимися звездами. Они играют важную роль в транспортировке массы и энергии от породившего их центрального тела, а в галактическом масштабе — в регулировании интенсивности процессов звездообразования.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ось вращения Sgr A* ориентирована в направлении, параллельном оси вращения Млечного Пути, из чего астрономы сделали вывод, что межзвездный газ и пыль непрерывно падали на черную дыру в течение последних 10 млрд лет. Если бы наша Галактика в сравнительно недавнем прошлом испытывала столкновения с другими звездными системами и их центральные черные дыры слились бы с Sgr A*, джет мог бы быть направлен как угодно. Рентгеновское излучение, обнаруженное телескопом Chandra, и радиоизлучение, наблюдаемое VLA, возможно, по-видимому, при взаимодействии выброса с разреженным межзвездным веществом в окрестностях галактического центра. Два ключевых признака джета — высокозергетическое излучение, непосредственно указывающее на Sgr A*, и фронт ударной волны, наблюдае-



X-ray: NASA/CXC/UCLA/Z. Li et al.; Radio: NRAO/VLA

Ученые получили первые доказательства существования выброса высокозергетических частиц, связанного со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути. Это изображение радиоисточника Стрелец А* и окружающей области пространства составлено по данным рентгеновского телескопа Chandra (сиреневый цвет) и массива радиоантенн VLA (синий цвет).



▲ Джеты активной черной дыры в центре галактики Агр 220.

мый в радиодиапазоне (он образуется при столкновении высокоскоростного выброса с окружающим холодным газом).

Поскольку Sgr A* в настоящее время, похоже, «сидит на диете» (на нее выпадает очень мало вещества), неудивительно, что ее джет выглядит очень слабым. Струя в противоположном направлении не видна, возможно, из-за того, что ее загораживает от нас плотное газово-пылевое облако.

Область пространства вокруг Sgr A* почти не содержит пыли и газа, что может быть свидетельством относительно «спокойного» поведения этого сверхмассивного объекта в течение последних нескольких сотен лет. Гигантская черная дыра была гораздо более активной в плане потребления веще-

▲ Гигантские «пузыри», образованные частицами высоких энергий и обнаруженные гамма-телескопом Fermi (показаны сиреневым цветом).

ства в прошлом. Когда наступит новый сезон «подкрепления», она может значительно увеличить яркость. Астрономы предполагают, что гигантские «пузыри», образованные частицами высоких энергий и обнаруженные гамма-телескопом Fermi в 2008 г., обязаны своим появлением последнему из таких «сезонов»,⁴ причем это отождествление не противоречит пространственной ориентации Галактики и джета.

Масса черной дыры в центре Млечного Пути составляет около 4 млн солнечных масс, она расположена на расстоянии порядка 26 тыс. световых лет от Солнца.

¹ ВПВ №12, 2005, стр. 14; №10, 2008, стр. 13

² ВПВ №11, 2013, стр. 5

³ ВПВ №1, 2006, стр. 7

⁴ ВПВ №11, 2013, стр. 14

Глинистые минералы на льду Европы

Новый анализ данных, переданных космическим аппаратом Galileo,¹ предоставил доказательства существования на ледяной поверхности юпитерианского спутника Европы² глинистых минералов, которые, по мнению астрономов, оказались там в результате столкновения этого спутника с астероидом или кометой. Такие породы, как правило, также содержат органические вещества, способные стать основой для возникновения жизни «земного типа».


«Органические материалы, являющиеся важными строительными блоками для жизни, часто встречаются в кометах и астероидах, — прокомментировал открытие Джим Ширли, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения в Пасадене (Jim Shirley, JPL NASA), на заседании Американского геофизического союза в Сан-Франциско 13 декабря. — Поиск остатков этой кометной катастрофы на поверхности Европы может открыть новую главу в истории поиска жизни на спутнике».

Многие ученые считают, что Европа является лучшим местом в нашей Солнечной системе (после Земли) для существования живых организмов. На ней присутствует глубинный океан, имеется ледяная поверхность, взаимодействующая с ним, на поверхности найдены соли, которые создают химический «энергетический градиент»,³ и источники тепла, связанные с деформацией недр спутника при их растяжении и сжатии под действием приливных сил со стороны Юпитера. Продолжительное время под сомнением оставалось наличие на поверхности Европы органических материалов, однако и они уже обнаружены непосредственно.

¹ ВПВ №1, 2006, стр. 31; №10, 2007, стр. 24

² ВПВ №3, 2005, стр. 16

³ ВПВ №9, 2013, стр. 15



▲ На этом изображении, полученном космическим аппаратом Galileo, показан регион поверхности Европы (самого маленького из четырех галилеевых спутников Юпитера), где впервые обнаружены глиноподобные минералы. Их концентрации отображаются условным синим цветом. Участки поверхности с преобладанием водяного льда окрашены в красный цвет. Съемка велась в инфракрасном диапазоне спектра. Ученые считают, что глинистые минералы появились в верхних слоях ледяной коры Европы при падении астероида или кометы, поскольку подобные минералы часто входят в их состав. Кроме того, эти тела, как правило, также обогащены органическими соединениями.


Ширли и его коллеги, финансируемые за счет гранта NASA (научно-исследовательского отдела внешних планет), смогли увидеть минералы типа слоистых силикатов на изображениях, полученных в ближней инфракрасной области спектра зондом Galileo в 1998 г. Хоть использованные снимки имеют невысокое по нынешним меркам пространственное разрешение, тем не менее, специалисты, применив довольно изощренную методику фильтрации, сумели «вытащить» нужный сигнал из достаточно сильного шума. Так называемые филлосиликаты обнаружены в области неправильной формы шириной примерно 40 км, удаленной на 120 км от центра 30-километрового кратера.

В качестве наиболее приемлемого объяснения возникновения этих отложений предложен выброс материала при падении астероида или кометы под углом около 45° к поверхности. В первом случае диаметр упавшего тела должен был бы составлять примерно 1,1 км, во втором — не превышал бы 1,7 км. При небольшом угле падения часть выброшенного вещества вскоре выпадает обратно на поверхность. При большем угле (близком к вертикали) почти все оно либо испарится, либо безвозвратно улетит в окружающее космическое пространство. Предположение о том, что слоистые силикаты смогли попасть на поверхность Европы из глубин этой луны, признано маловероятным, учитывая то обстоятельство, что она покрыта ледяной корой, толщина которой в отдельных регионах может достигать 100 км. Следовательно, эти минералы могут быть только остатками упавшего тела.

«Четкое представление об особенностях химического состава Европы является ключом к расшифровке ее истории и ответу на вопрос о потенциальной обитаемости, — сказал Боб Паппалардо (Bob Pappalardo) из Лаборатории реактивного движения, участник подготовки новой экспедиции в систему Юпитера. — Этот пункт научной программы предполагаемой космической миссии придаст ей химическую специфику и усилит ее направленность на поиск возможной микробной жизни — в далеком прошлом и, возможно, в настоящем».

Источник: Clay-Like Minerals Found on Icy Crust of Europa. — NASA/JPL Press release, December 11, 2013.

▼ Так, по мнению художника, могло выглядеть падение на Европу кометы или астероида.



Водяные шлейфы в системе Юпитера

Космический телескоп Hubble зарегистрировал водяной пар над холодной южной полярной областью Европы, что стало первым убедительным доказательством наличия гейзеров, извергающихся с ледяной поверхности этого юпитерианского спутника.

Результаты других исследований уже указывали на существование океана, расположенного под европеанской ледяной корой. Ученые еще не полностью уверены, что обнаруженный пар обязан своим происхождением водяным гейзерам, но это объяснение выглядит наиболее вероятным. Если дальнейшие наблюдения подтвердят предложенную гипотезу, это сделает Европу вторым спутником в Солнечной системе, обладающим шлейфами водяного пара.

Лоренц Рот из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио (Lorenz Roth, Southwest Research Institute, San Antonio, Texas), один из авторов статьи в журнале *Science Express*, считает, что самым простым объяснением наблюдаемого явления является то, что пар вырвался с поверхности Европы. Если эти выбросы связаны с водным океаном, который, по утверждавшемуся мнению, существует под ледяной корой, это означает, что в будущем можно непосредственно исследовать химический состав потенциально обитающей среды спутника, не прибегая к бурению мощных слоев льда.

В 2005 г. первый искусственный спутник Сатурна Cassini обнаружил аналогичные струи водяного пара и мелких ледяных частиц, извергающиеся из трещин на поверхности сатурнианской луны Энцелада.¹ Позже в ходе пролетов сквозь эти струи космический аппарат зарегистрировал присутствие в них органических соединений.²

Спектроскопические наблюдения телескопа Hubble подтвердили существование шлейфов Европы в декабре 2012 г. Дальнейшее изучение их изменений со временем позволило исследователям различить особенности, связанные с заряженными частицами юпитерианской магнитосферы, а также исключить более экзотические объяснения (наподобие последствий метеоритного удара).

Спектрограф обнаружил около южного полюса Европы слабое ультрафиолетово-

е излучение, возбуждаемое мощным магнитным полем Юпитера и связанное с атомами кислорода и водорода на высоконергетических уровнях — оно служит верным признаком того, что эти атомы являются продуктами разрушения молекул воды, которые частично превратились в ионы и движутся вдоль магнитных силовых линий. Очень слабый выброс был зарегистрирован на пределе аппаратных возможностей телескопа Hubble. Длинные трещины на поверхности Европы могут быть «вентиляционными каналами» для выхода в космос водяных паров, подобно «тигровым полосам» на Энцеладе.

Также команда телескопа Hubble обнаружила, что интенсивность европеанских шлейфов, как и на Энцеладе, меняется в зависимости от положения луны на орбите. Активные джеты заметны только тогда, когда Европа находится на большем удалении от Юпитера. Одно из объяснений этой изменчивости заключается в том, что отверстия каналов, через которые выходит водяной пар, сужаются или вообще закрываются, когда спутник приближается к газовому гиганту.


Поскольку Европа обладает примерно в 12 раз более мощным гравитационным полем по сравнению с Энцеладом, на 40-градусном морозе основная часть пара не устремляется в космос, а, скорее всего, выпадает обратно на поверхность после достижения высоты около 200 км.

Исследователи считают, что в ближайшем будущем — после прибытия в окрестности Юпитера автоматического аппарата Juno³ — они смогут найти подтверждение своей гипотезы на снимках приполярных областей спутника (точнее, его южной области).

Вдохновленный значимостью полученной информации, американский астронавт Джон Грунсфельд (John Grunsfeld), принимавший участие в трех миссиях к космическому телескопу Hubble с целью его ремонта и дооснащения, с гордостью заявил, что усилия и риск, которые потребовались для обеспечения работоспособности обсерватории, становятся все более оправданными.


Источник: *Hubble Sees Evidence of Water Vapor at Jupiter Moon.* — NASA/JPL Press release, December 12, 2013.

NASA/ESA/K. Retherford/SWRI



▲ Так могут выглядеть струи водяного пара, извергающиеся из-под холодной ледяной поверхности юпитерианского спутника Европы. Спектроскопические измерения космического телескопа Hubble позволили ученым подсчитать, что эти струи поднимаются на высоту до 200 км, а затем, вероятно, выпадают обратно на поверхность в виде мелкого снега. Предыдущие исследования уже подтвердили наличие глубинного океана под ледяной корой Европы.

NASA/ESA/L. Roth/SWRI/University of Cologne



▲ На этой схеме графически показано облако водяного пара, обнаруженное над южным полюсом Европы в ходе наблюдений телескопа Hubble в декабре 2012 г. Это первые убедительные доказательства водяных шлейфов, извергающихся из недр спутника. Hubble не фотографировал шлейфы непосредственно, а спектроскопически обнаружил своеобразные «полярные сияния» выбросов кислорода и водорода. Сияния возбуждаются при взаимодействии атомов с магнитным полем Юпитера. Европа — второй спутник в Солнечной системе, у которого нашли истечения водяного пара из-под ледяной поверхности.

¹ ВПВ №8, 2005, стр. 21

² ВПВ №4, 2008, стр. 10

³ ВПВ №8, 2011, стр. 22; №11, 2013, стр. 27

«Белый заяц» прилунился


Китайская Народная Республика стала третьей страной мира (после СССР и США), чей космический аппарат совершил мягкую посадку на Луну.

Первый китайский луноход «Юйту» («Нефритовый заяц») вместе с аппаратом прилунения «Чанъэ-3» был запущен 2 декабря 2013 г. в 1:30 по пекинскому времени (1 декабря в 17:30 UTC) с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» («Великий поход-3Б»). В китайском фольклоре Юйту — это белый заяц, любимец Чанъэ, на протяжении тысяч лет почитаемой в Китае богини Луны. Ее имя носит национальная программа исследований естественного спутника Земли.

На 1130-й секунде полета «Чанъэ-3» отделился от ракеты-носителя и вышел на переходную орбиту с перигеем около 200 км и апогеем 380 тыс. км. По команде, переданной со специализированного судна «Юаньван-6», аппарат успешно активизировал посадочный модуль и развернул панели солнечных батарей.

Запуск «Чанъэ-3» стал началом реализации второго этапа китайского проекта лунных исследований. В 2007 г. Китай осуществил запуск спутника-зонда «Чанъэ-1»,¹ в 2010 г.

¹ ВПВ №11, 2007, стр. 19;
№3, 2009, стр. 20



▲ Примерное место прилунения китайского аппарата «Чанъэ-3», запущенного 1 декабря 2013 г. в 17:30 UTC и коснувшегося лунной поверхности 14 декабря 2013 г.

к Луне отправился «Чанъэ-2».² Первый аппарат собрал большое количество научных данных и составил трехмерную карту поверхности Луны. Второй уточнил и дополнил эту карту — в частности, передал на Землю снимки Залива Радуги с высоким разрешением. Однако до сих пор китайские межпланетные станции не совершали посадок на лунную

поверхность. Эту операцию в перспективе предстоит осуществить также зонду «Чанъэ-4». В ходе третьего этапа программы аппараты «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» должны будут вернуться с Луны на Землю.

6 декабря в 9:53 UTC «Чанъэ-3» после 112-часового перелета успешно вышел на сelenоцентрическую орбиту. 10 декабря по команде с Земли он начал торможение с целью выхода на эллиптическую орбиту с высотой периселения 15 км и апоселения 100 км. 14 декабря 2013 г. в 13:11:18 UTC китайский межпланетный зонд совершил первую в истории космонавтики КНР мягкую посадку на поверхность Луны.


Хотя предварительно было анонсировано, что посадка произойдет в заливе Радуги, на самом деле аппарат прилунился в Море Дождей, у восточного края посадочного «окна», примерно в 40 км к югу от кратера Лаплас в точке с координатами 44,1260° с.ш., 19,5014° в.д. Неизвестно,

было ли это сознательным решением команды управления или же сбоем, но в любом случае это место с научной точки зрения оказалось еще интереснее, чем первоначально намеченное.

«Чанъэ-3» состоит из двух частей: аппарата прилунения с четырьмя опорами и шестиколесного лунохода. Спускаемый аппарат имеет сухую массу около 1200 кг, стартовую — 3700-3780 кг. В качестве источников энергии он использует солнечные батареи и радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). Прилунение происходило полностью автономно. Долгие лунные ночи он будет проводить в «спящем режиме». Из научной аппаратуры на борту установлен «Лунный ультрафиолетовый телескоп» для фотографирования звезд и галактик (150-мм рефлектор системы Ричи-Кретьена, оснащенный ПЗС-матрицей с 13-микронными пикселями, которому доступны объекты до 13^m) и «Камера для исследо-

² ВПВ №10, 2010, стр. 24

▼ Снимок посадочной ступени «Чанъэ-3», сделанный первым китайским луноходом «Юйту».



ваний в дальнем ультрафиолете лунного базирования» (поле зрения 16° , разрешение $0,1^\circ$, съемка будет производиться раз в 10 минут) для изучения земной плазмосферы — самых внешних областей ионосферы Земли. Имеются также три панорамные камеры, посадочная камера для системы автономной посадки, технические камеры и почвенный зонд. Посадочная камера использовалась для съемки поверхности при снижении во время зависаний продолжительностью до 100 секунд и выбора окончательной точки прилунения.

Луноход массой около 120 кг (масса научной аппаратуры — 20 кг) сошел на поверхность с одной из двух частично опускающихся рамп. Он имеет только две солнечных батареи и тоже будет «засыпать» в лунные ночи. Достоверно неизвестно, установлены ли на нем радиоизотопные источники тепла. Шестиколесное шасси, похожее на шасси роверов MER³ и MSL⁴, рассчитано на

10 км пробега. Навигационная система способна автономно привести аппарат к выбранной цели, проложив маршрут и избежав препятствий. Среди других инструментов — георадар, две панорамные и четыре технические камеры, а также манипулятор с двумя спектрометрами (альфа-частиц, видимого и ближнего инфракрасного диапазона). В задачи ровера, способного двигаться со скоростью до 200 м/ч, входит исследование состава и структуры вещества лунной поверхности.

На луноходе, во время полета располагавшегося над аппаратом прилунения, сверху имеются две фотокамеры и одна направленная антенна, внизу — механические «руки» для зондирования лунного грунта. После прилунения мобильная лаборатория автоматически спустилась на поверхность Луны и начала самостоятельные исследования. Предполагается, что она проработает не менее трех месяцев, а посадочный модуль — около года.


Поскольку «Юйтю» во время своего путешествия сможет обследовать несколько разнотип-

ных областей, он передаст на Землю новую информацию для более четкой интерпретации данных, полученных в ходе орбитальной съемки. Как минимум он проверит состав поверхности, сложенной магматическими базальтами, в которых, судя по цветовым измерениям американского зонда Clementine,⁵ должен в больших количествах присутствовать титан. Поскольку китайский луноход может посетить зоны выбросов крупных кратеров, есть надежда получить данные и о глубинных лунных породах. С их помощью, возможно, удастся реконструировать вулканическую стратиграфию всего региона.

«Юйтю» уже передал с Луны на Землю первые снимки. Аппарат запечатлев посадочный модуль, с которого, в свою очередь, был в автоматическом режиме сфотографирован сам луноход. На кадрах, переданных Центральным китайским телевидением, хорошо видны глубокие следы от колес ровера. Взаимная съемка «Чанъэ-3» и «Юйтю» будет проводиться и далее.

³ ВПВ №1, 2004, стр. 22; №9, 2009, стр. 22

⁴ ВПВ №8, 2012, стр. 12



▲ Луноход «Юйтю» готов отправиться в путь по лунной поверхности. Снимок сделан камерой посадочного модуля «Чанъэ-3» 15 декабря 2013 г.

⁵ ВПВ №1, 2008, стр. 24

«Чанъэ-2»: китайский рекорд дальности

К настоящему времени расстояние между Землей и вторым китайским аппаратом зондирования Луны «Чанъэ-2», осуществившего также съемку астероида Тутатис (4179 Toutatis),¹

¹ ВПВ №12, 2012, стр. 24

превысило 60 млн км. Аппарат продолжает углубляться в космическое пространство. По расчетам специалистов Пекинского центра управления космическими полетами, при благоприятных условиях «Чанъэ-2»,

ставший первой китайской «искусственной планетой», сможет перешагнуть отметку удаленности от Земли в 300 млн км и стать самым далеким рукотворным объектом, сделанным в Китае.

Космический шаттл ENDEAVOR (NASA)

Endeavour (в пер. с англ. — «стремление») многоразовый транспортный космический корабль NASA, пятый и последний «космический челнок». Его строительство было начато 1 августа 1987 г. взамен погибшего шаттла Challenger, а 7 мая 1991 г. Endeavour был передан в эксплуатацию под индексом OV-105 (Orbiter Vehicle — 105). Первый полет Endeavour совершил 7 мая 1992 г. В 1993 г. на нем была совершена первая экспедиция по обслуживанию космического телескопа Hubble. В декабре 1998 г. Endeavour доставил на орбиту первый американский модуль для МКС. С мая 1992 по июнь 2011 г. шаттл Endeavour совершил 25 полетов, провел в космосе более 299 суток, совершил 4671 оборот вокруг Земли и пролетел, в общей сложности 198 млн км. По окончании эксплуатации его было решено выставить в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе, куда он и был доставлен 14 октября 2012 г. Перед этим космический аппарат проделал 19-километровый путь по улицам города на глазах тысяч зрителей. Местным властям пришлось срубить около 400 деревьев, чтобы расчистить путь для него.

Модель производства компании Dragon выполнена в масштабе 1:400

www.shop.universemagazine.com

Этот снимок участка неба в созвездии Рыб является одним из первых, сделанных инфракрасными камерами «воздрожденного» космического аппарата WISE. Цепочка из красных точек — изображения астероида, полученные в ходе серии экспозиций (за время между экспозициями астероид успевал заметно сместиться относительно «звездного фона»). Обнаруженный объект принадлежит к главному астероидному поясу Солнечной системы, расположенному между орбитами Марса и Юпитера. Он называется Холда (Holda) и имеет номер 872, открыт его в 1917 г. известный немецкий астроном Макс Вольф (Maximilian Franz Joseph Wolf). Слабый красный штрих в верхней части снимка — «слея» другого спутника, находящегося на более высокой околоземной орбите.

WISE вернулся к наблюдениям

Космический аппарат WISE, осуществивший в рамках миссии Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE)¹ наиболее полный обзор астероидов и комет, был временно отключен после исчерпания бортовых запасов хладагента. Теперь его решено «вернуть в строй» с целью продолжения поисков малых тел Солнечной системы. На протяжении двух последних месяцев проводилось его тестирование в рамках новой миссии.

За время функционирования на околоземной орбите WISE уже обнаружил более 34 тыс. астероидов и подтвердил существование свыше 158 тыс. известных по состоянию на начало его основной миссии малых тел Солнечной системы. Он был «разбужен» в сентябре 2013 г., после 30-месячной спячки, и возобновил свою нелегкую работу по содействию NASA в выявлении популяции потенциально опасных объектов, сближающихся с Землей (Near-Earth Objects — NEO). Космический аппарат также способен помочь уточнить характеристики ранее обнаруженных объектов, которые могут рассматриваться в качестве потенциальных целей для будущих исследовательских миссий. «WISE не только поможет нам лучше понять изучаемые объекты, но и способствует уточнению наших представлений о задачах миссий, планируемых на будущее, а также каталогизации объектов наблюдений», — объяснила Эми Майнцер, главный исследователь миссии NEOWISE.

¹ ВПВ №1, 2010, стр. 22; №10, 2010, стр. 11; №10, 2011, стр. 22

в Лаборатории Реактивного Движения в Пасадене (Amy Mainzer, JPL NASA). — Спутник находится в отличном состоянии, и последние полученные им снимки звездных полей выглядят так же хорошо, как перед консервацией. В течение ближайших нескольких месяцев мы надеемся найти на просторах Солнечной системы нашу первую добычу — новый астероид, предтечу дальнейших удач и открытий».

Некоторые снимки глубокого космоса, полученные аппаратом WISE, запечатлели обнаруженный ранее астероид Холда (872 Holda). Его диаметр составляет 42 км, он обращается вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера в области, которую астрономы называют «поясом астероидов».² Ученые весьма довольны тем, что качество наблюдений космического аппарата столь же высоко, как и в ходе основной миссии.

На спутнике установлен 16-дюймовый (40 см) телескоп и инфракрасные камеры для поиска неизвестных NEO, определения их размеров, альбедо (отражательной способности) и тепловых свойств. Астероиды отражают, но не излучают видимый свет, поэтому данные, собранные с помощью оптических телескопов, предоставляют лишь малую часть информации об исследуемом объекте, не позволяя, например, с приемлемой точностью оценить его поперечник. Датчики ИК-излучения стали мощным инструментом для расширения наших знаний об астероидной популяции. Некоторые из объектов, изучаемых NEOWISE, могут

оказаться целями объявленной NASA программы по захвату и изменению орбиты астероида.³ Это будет беспрецедентный технический эксперимент, ведущий к новым научным открытиям и технологическим прорывам, которые помогут защитить нашу планету. Астероидная инициатива объединяет лучший интеллектуальный потенциал NASA для достижения объявленной президентом Обамой задачи — отправки людей на астероид к 2025 г.⁴ «Важно, чтобы мы накопили как можно больше данных, пока космический аппарат остается дееспособным», — прокомментировала «возрождение» WISE Линдли Джонсон (Lindley Johnson), исполнительный директор миссии NEOWISE.

Перед космическим телескопом, выведенным на околоземную орбиту в декабре 2009 г., изначально стояла задача провести мониторинг всей небесной сферы в инфракрасных лучах. WISE получил свыше 2,7 млн изображений в нескольких участках спектра (от ближнего до среднего ИК-диапазона) и каталогизировал более 747 млн объектов, начиная от далеких галактик и заканчивая околоземными астероидами. NASA выключила большую часть электроники аппарата, когда он завершил свою основную миссию в феврале 2011 г., но оставила возможность для его дальнейшей эксплуатации.

Источник: NASA's Asteroid Hunter Spacecraft Returns First Images after Reactivation. — NASA/JPL Press Release, December 19, 2013.

³ ВПВ №1, 2013, стр. 24

⁴ ВПВ №7, 2011, стр. 10

Стартовал «Прогресс М-21М»

Успех ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс М-21М» с ПУ № 6 площадки № 31 космодрома Байконур состоялся 25 ноября 2013 г. в 20:53:06 UTC (26 ноября в 0 часов 53 минуты 6 секунд по московскому времени). Через 9 минут после старта корабль отделился от последней ступени носителя и вышел на околоземную орбиту.

29 ноября в 22:30:20 UTC «Прогресс М-21М» был пристыкован к Международной космической станции (МКС). Сближение осуществлялось

в автоматическом режиме, а собственностыковка — космонавтом Олегом Котовым в режиме ТОРУ. Перейти в ручной режим специалисты Центра управления полетами решили из-за рассогласования прогнозируемых и измеряемых параметров системы сближения.

Российский грузовой корабль доставил на борт МКС две с половиной тонны разнообразных грузов, в том числе воду, воздух, продукты питания, топливо для бортовой двигательной установки станции.



▲ Командир экспедиции МКС-38 российский космонавт Олег Котов, считывает данные ручной системы стыковки ТОРУ в служебном модуле «Звезда» во время операций сближения и стыковки с грузовым кораблем «Прогресс».

Cygnus: старт отложен

Первый регулярный рейс нового американского коммерческого грузового корабля Cygnus к Международной космической станции, отложенный из-за неполадок на борту орбитального комплекса, теперь запланирован на 7 января. «Грузовик» будет запущен с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) у атлантического побережья США. Если все пойдет по плану, стыковка корабля с орбитальным комплексом состоится 10 января.

Первоначально запуск Cygnus был намечен на 19 декабря, но потом был перенесен из-за проблем с системой охлаждения американского сегмента станции. В ее насосе заклинило клапан, и вдобавок оказались обесточены некоторые узлы, не имеющие первостепенного значения. Охлаждение было переведено на второй контур, неспособный в полной мере справиться с возросшей нагрузкой. Часть оборудования, не столь критичная для функционирования станции, была отключена. Однако по-преж-


▼ Рик Мастраккио и Майк Хопкинс 24 декабря осуществили успешную предрождественскую «космическую прогулку». Для Мастраккио этот выход в открытый космос стал восьмым в его карьере.

нему не исключалась возможность возникновения проблем с выработкой электричества. Из соображений безопасности полета все операции, связанные с повышенным расходом энергии (в том числе стыковки МКС с другими космическими аппаратами), перенесли на более поздние сроки. Cygnus, уже стоявший на стартовой площадке, был возвращен в ангар на космодроме.

Для замены насоса системы терморегуляции, сломавшегося 11 декабря, решено было провести три неплановых выхода в открытый космос. Первый из них начался 22 декабря в 12:00 UTC (7 часов утра по времени Восточного побережья США) и завершился в 17:29 UTC, продлившись 5 часов 29 минут. В нем участвовали астронавты Рик Мастраккио и Майк Хопкинс (Rick Mastracchio, Mike Hopkins). Изначально предполагалось, что они будут находиться в открытом космосе около 6,5 часов. NASA также рассматривала возможность увеличить продолжительность выхода до 7 часов, однако этого не потребовалось. Операция оказалась чрезвычайно успешной, астронавты действовали со значительным опережением графика и выполнили часть работ, запланированных на следующий сеанс внекорабельной деятельности. Им, в частности, удалось отключить и снять дефектный насос, а также убрать его на внешнюю грузовую платформу.

Ремонт системы охлаждения, включавший установку резервного насоса на место дефектного, был завершен в течение следующего выхода, первоначально намеченного на 23 декабря, но в итоге осуществленного на сутки позже. Этот выход продолжался 7 часов 30 минут. Его перенос связан с тем, что на завершающем этапе первого выхода — уже в шлюзовом отсеке — Мастраккио случайно повредил свой скафандр, и экипажу станции потребовалось дополнительное время для подготовки запасного. Третий сеанс внекорабельной деятельности, намеченный на 25 декабря, был отменен ввиду отсутствия необходимости в нем.

Первый (демонстрационный) полет корабля Cygnus, созданного компанией Orbital Sciences Corp., состоялся в сентябре 2013 г. «Грузовик» доставил на МКС около 700 кг различных грузов.¹



¹ ВПВ №11, 2013, стр. 25

Mars One: на шаг ближе к реальности



Aмериканская компания Lockheed Martin и британская Surrey Satellite Technology Ltd получили контракт на разработку марсианского посадочного зонда и орбитального аппарата — первой беспилотной миссии проекта Mars One, который предполагает создание после 2023 г. колонии землян на Красной планете.¹ В 2018 г. должен состояться первый старт: к Марсу отправятся посадочный аппарат и спутник, предназначенный для ретрансляции радиосигнала с поверхности планеты на Землю. В рамках этой миссии планируется проверка ряда технологических решений для следующих этапов проекта, в том числе строительства будущего поселения.

¹ ВПВ №6, 2013, стр. 17

Mars One заключила контракт на создание концепции миссии, при этом планируется, что SSTL построит орбитальный аппарат, а Lockheed — посадочный модуль. Последний будет основан на конструкции зонда Phoenix, который в 2008 г. совершил успешную посадку в приполярной области Марса.²

Новый аппарат также сможет взять пробы поверхностных пород с помощью манипулятора и вдобавок изучить возможность извлечения воды из марсианского грунта. Кроме того, на поверхности должны быть развернуты тонкопленочные солнечные панели. Орбитальный аппарат станет главным элементом широкополосного канала ретрансляции полученных данных на Землю.

² ВПВ №6, 2008, стр. 20

Запущены европейские спутники

Tри европейских научных спутника Swarm были запущены 2 ноября 2013 г. в 12:02 UTC с космодрома Плесецк стартовыми расчетами Войск Воздушно-космической обороны РФ по заказу компании Eurockot Launch Services. Пуск осуществлен с помощью ракеты-носителя «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ», после отделения от которого спутники вышли на целевые орбиты.

Swarm является очередным проектом Европейского космического агентства (ESA), предусматривающим создание серии

спутников Earth Explorer, задача которых — изучение важнейших параметров Земли и их изменений под воздействием деятельности человека. Космические аппараты предназначены для измерения магнитных сигналов, исходящих из ядра, мантии, коры, океанов, ионосферы и магнитосферы нашей планеты. Спутники принадлежат ESA и рассчитаны на 4 года эксплуатации (не считая трех месяцев пусконаладочных работ). Стартовая масса каждого из них — 468 кг, включая массу рабочего тела для бортовых ракетных


двигателей (фреон, 99 кг).

Космические аппараты были успешно выведены на расчетные орбиты и через 90 минут после запуска вышли на связь с наземным центром управления. Затем они развернули специальные металлические штанги, на которых находятся датчики магнитометров. Данные, полученные этими приборами, показали, что соотношение «сигнал-шум» у них лучше, чем ожидалось. В данный момент миссия находится в фазе трехмесячной подготовки к штатной научной работе.

Иран запустил в космос вторую обезьяну

Iран запустил в космос вторую обезьяну. Согласно сообщению, размещенному 14 декабря на сайте Президента исламской Республики, запуск прошел успешно, обезьяна по кличке Фаргам вернулась на Землю живой и невредимой.

По данным пресс-службы президента, обезьяна совершила полет по суборбитальной траектории на ракете «Паджонеш». Максимальная высота подъема ракеты составила 120 км, продолжительность полета — 15 минут. Когда состоялся старт ракеты, не уточняется.



Впервые успешный запуск космического аппарата с обезьянкой на борту Иран произвел в январе 2013 г. Кapsула с животным, получившая название «Пишгам», побывала на высоте более 120 км и вернулась на Землю. В сентябре 2013 г. власти страны сообщили, что следующим позвоночным, которое будет отправлено в космос, может стать персидский кот. Ранее Иран уже отправлял в космос живые организмы — червей, черепаху и крысу. Запуски животных в космос производятся в рамках подготовки страны к полету первого иранского астронавта, намеченному на 2021 г.

Неудачный запуск китайско-бразильского спутника

Безупречное выполнение космической программы Китая нарушил неудачный запуск китайско-бразильского спутника дистанционного зондирования Земли CBERS-3 («Цзыюань-1-03»), произведенный 9 декабря 2013 г. в 03:26 UTC с площадки № 9 космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4В» («Великий поход-4В»). Первые сообщения говорили о полном успехе. Однако позже появилась информация, что пуск был аварийным и космический аппарат не вышел на расчетную орбиту из-за неисправности ракеты-носителя.

Проведя анализ происшествия, китайские специалисты пришли к выводу, что во время запуска космического аппарата CBERS-3 третья (последняя) ступень ракеты-носителя отработала примерно на 11 секунд меньше планового времени, в результате чего спутник оказался на околоземной орбите с перигеем значительно ниже расчетного — приблизительно 153 км — и вскоре после раскрытия солнечных батарей вошел в атмосферу Земли в районе Антарктики. Китайские специалисты подтвердили факт аварии через три часа после пуска. Эта неудача нарушила

непрерывную череду успешных космических стартов в Китае, длившуюся с лета 2011 г. — после того, как 18 августа 2011 г. на орбиту не был выведен спутник «Шичжан 11-04» из-за проблем со второй ступенью ракеты «Чанчжэн».

Сотрудничество между Бразилией и Китаем в космической сфере за последние 25 лет принесло ощущимые плоды. «Цзыюань-1-03» стал четвертым по счету спутником в серии «Цзыюань-1», совместно разработанной двумя странами. Поскольку три запущенных ранее спутника функционируют нормально, бразильские специалисты уверены в продолжении плодотворного сотрудничества в данной области. В то же время Бразилия теперь рассчитывает на досрочный запуск спутника «Цзыюань-1-04» (CBERS-4), который в связи с произошедшей аварией может отправиться в космос уже в следующем году, а не в 2015 г., как предполагалось ранее.

В настоящее время под угрозой срыва находится запуск двух спутников серий «Гаофен» и BRITE-PL, вывод которых на орбиту с помощью того же носителя и с того же космодрома был запланирован на 29 декабря 2013 г.

Космическому роботу «сделают ноги»

Мини-робот Robonaut 2 (R2), являющийся внештатным членом команды МКС, скоро получит ноги: над этим сейчас трудятся инженеры NASA. В настоящее время R2 — безногое туловище, крепящееся к опорной стойке. Робот прибыл на станцию в феврале 2011 г. в ходе последнего полета шаттла *Discovery*¹ и стоил 2,5 млн долларов США. Благодаря вмонтированным в голову четырем камерам он ориентируется в пространстве и транслирует все происходящее вокруг на мониторы операторов. Сейчас астро-

навты на МКС проводят испытания блока R2, зафиксированного в стационарном положении внутри орбитальной лаборатории. Новые «коночности» предоставят роботу мобильность, которая нужна ему для того, чтобы регулярно выполнять повторяющиеся задачи внутри станции и за ее пределами с целью освободить от выполнения рутинной работы членов экипажа и дать им возможность заниматься более сложными и серьезными задачами, в том числе научными исследованиями.

Ноги для R2 уже собраны, робот получит их в начале следующего го-

да. Они сконструированы для работы как на борту МКС, так и за ее пределами, однако требуется провести доработку верхней части корпуса R2, чтобы он смог работать в открытом космосе.

Следующее поколение роботов-гуманоидов «в лице» нового аппарата R5 было представлено публике в декабре на Состязаниях роботов, организуемых Агентством современных оборонных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Project Agency — DARPA). «Участники» состязания продемонстрировали способность выполнять сложные задачи в различных условиях.



Американская ракета-носитель Saturn V остается самой грузоподъемной, самой мощной, самой тяжелой и самой большой из созданных на данный момент человечеством ракет, доставлявших полезную нагрузку на орбиту — детище выдающегося конструктора ракетной техники Вернера фон Брауна, она могла вывести на низкую околоземную орбиту 141 т и на траекторию полета к Луне 47 т полезного груза (65,5 т вместе с 3-й ступенью носителя), высота ракеты достигала 110,6 м, диаметр — 10,1 м. Saturn V была «сердцем» программ NASA Apollo и Skylab в период 1967-1974 гг. В общей сложности состоялось 13 запусков, причем все они были успешными. Благодаря этому 24 астронавта побывали в окрестностях Луны, 12 из них — на лунной поверхности.

Модель ракеты, выполненная компанией Dragon в масштабе 1:72, вызвала большой ажиотаж на выставке Tokyo Hobby Show. Нельзя сказать, что это миниатюрная модель — она огромна даже в таком масштабе! Полностью собранная, она имеет высоту 1,5 м.

Модель состоит из командно-служебного модуля, системы аварийного спасения, а также трех ступеней ракеты-носителя, все детали которой тщательно воспроизведены. Окраска и маркировка максимально приближены к оригиналу. Saturn V является наиболее подходящей моделью для показа на дому и в качестве главного элемента любой космической коллекции. Она снабжена круглой подставкой для большей устойчивости на горизонтальных поверхностях. Удивите своих друзей этой фантастической моделью!

Заказ можно оформить: • в Интернет-магазине
• почтой по адресу: 02152, Киев,
Днепровская набережная, 1А, оф.146
• по телефону (067) 215-00-22,
(044) 295-00-22.

Оплата на сайте при оформлении заказа, в любом отделении банка, через терминалы i-box или на почте при получении. Доставка по Украине осуществляется Укрпочтой, Новой почтой, по Киеву — бесплатно (при заказе от 300 грн.).

¹ ВПВ №3, 2011, стр. 12

Судьба дарит избранным уникальные возможности. Джерри Росс получил свой приз, осуществив 7 орбитальных полетов и проведя в космосе 58 суток, 1 час и 1 минуту своей жизни, из которых 58 часов 24 минуты он находился за бортом космических аппаратов — один на один с безграничной Вселенной.

7 полетов Джерри Росса

**Леон Розенблюм,
Израиль
член Британского
межпланетного общества**



Первый старт Джерри Росса:
шаттл Atlantis, 26 ноября 1985 г.
(миссия STS 61-B).

Среди книг о космонавтике произведения автобиографического жанра, написанные непосредственными участниками событий, представляют, пожалуй, наибольший интерес. В полной мере это относится и к книге американского астронавта Джерри Росса — одного из двух землян, побывавших в космосе семь раз. Книга под заглавием «Астронавт в открытом космосе — рекордсмен по количеству полетов. Мое космическое путешествие и вера»¹ вышла в свет в 2013 г.

¹ Ross Jerry Lynn with Norberg John. *Spacewalker: my journey in space and faith as NASA record-setting frequent flyer*. Purdue University Press. West Lafayette, Indiana. 2013. — 274 p.

Поскольку не у всех читателей нашего журнала есть возможность прочитать эту книгу в оригинале, хотелось бы представить их вниманию некоторые выдержки из нее, наиболее колоритно, на взгляд автора этих строк (по совместительству — переводчика), повествующие о жизни и работе американских покорителей космоса.

Джерри Линн Росс (Jerry Lynn Ross) родился 20 января 1948 г. в Краун-Пойнт, штат Индиана. Окончив курсы офицеров запаса при Университете Пёрдью (Purdue University), он в 1972 г. поступил на службу в Военно-воздушные силы США. Во второй половине 1970-х в качестве

военно-авиационного инженера Росс участвовал в программе испытаний стратегического бомбардировщика B-1. В 1977 г. он подал заявление о приеме в астронавты, но получил отрицательный ответ. Зато, оказавшись в Хьюстоне, Росс был принят на работу в качестве сотрудника Отдела операций с полезной нагрузкой в Космическом центре имени Джонсона.

В 1979 г. NASA объявила еще один набор астронавтов, и я не без тревоги подал заявление во второй раз. Трои моих коллег в Отделе операций с полезной нагрузкой, уже проходившие собеседование в 1977 г., тоже подали заявления. Мы все знали, что вероятность быть отобранным даже для одного из нас весьма мала. Тогда поступило 6 тыс. заявлений, было проинтервьюировано 120 человек. Шаттлы все еще не начали летать.

...Телефон зазвонил 20 мая 1980 г. Я был в Центре управления, где меня разыскивали. На этот раз звонок был от м-ра Эбби.²

...Я почти не помню, что он сказал, но я помню, как меня трясло... Я улыбался до ушей... все поздравляли меня... Попасть в набор со второго раза было неплохо. Были люди, подававшие заявления семь раз — но так и не попавшие...

Полет первый: впервые в открытом космосе

Джордж Эбби был тяжелым человеком, если можно так выразиться. Нередко во время беседы его веки смыкались: казалось, что он засыпает, но это было не так. Он слушал и думал. Он был глубоким мыслителем... Он продумывал все на много ходов и лет вперед.

М-р Эбби, как это было типично для него, пригласил меня в свой кабинет и заговорил о погоде. Разговор начался бессодержательно. «Вы все еще заняты?» — поинтересовался он. Потом он спросил: «Хорошо, а как вам понравится другая работа? Я знаю, что вы заняты, но не хотите ли вы делать что-нибудь еще?».

«Конечно», — ответил я. Что еще можно сказать, когда босс предлагает тебе что-то новое? «Так вот, знаете, мы сейчас начинаем формировать новый экипаж», — продолжал он. Я едва не воспарил над своим креслом...

Начав подготовку к полету, Росс познакомился с коллегами по экипажу.

Брюстер [Шоу]³ был талантливым летчиком, очень грамотным инженером и уверенно становился превосходным менеджером в больших программах. Много ранее Брюстер удивил меня: еще в пору моей учебы в Школе летчиков-испытателей он однажды в классе наклонился надо мной и задал какой-то очень глубокий и сложный вопрос по технике из изучаемого материала. До того момента я воспринимал его просто как эдакого недалекого «пилотягу». После Школы он стал моим летным инструктором, помогая получить лицензию частного пилота, пока не был зачислен в астронавты и не уехал в Хьюстон. Брюстер уже летал до этого в качестве пилота STS-9.

Брайан [О'Коннор] служил пилотом морской пехоты и летчиком-испытателем, летавшим на самолете вертикального взлета Harrier. Вуди [Спринг] пилотировал вертолеты во Вьетнаме и был армейским летчиком-испытателем. Од-



▲ Джерри Линн Росс. Фотография астронавта с автографом автору статьи.

► Книга о семи полетах Росса.

ним из достижений Мэри [Клив] была степень доктора философии по санитарным технологиям. Мы прозвали ее «Сэнитари Мэри».

Настал день старта, и экипаж, поднявшись в кабину шаттла, занял свои кресла.

Эти кресла конструировал явно не специалист по эргономике. Он ни капли не позаботился об астронавтах, чтобы сделать ожидание старта комфортабельным. Кресла были тонкими, серыми, жесткими и спроектированными так, чтобы помочь нам перенести вибрации и перегрузки при запуске.

Космический корабль устремился вверх...

Возросшие перегрузки мешали дышать. Казалось, мне на грудь уселась горилла.

На орбите новичкам-астронавтам пришлось познакомиться с особенностями космического пространства.

У Мэри [Клив] были проблемы с управлением движением тела в невесомости. До момента нашего возвращения домой Санитарная Мэри получила новое прозвище: «Ой!». Она все время натыкалась на людей и предметы и с озорной улыбкой говорила: «Ой, извините».

Одной из главных задач миссии была сборка в грузовом отсеке шаттла двух видов решетчатых ферм. Длина одной из них — башни ACCESS — достигала почти 14 м.

Как и все патриотические экипажи, возводившие в космосе [различные] конструкции, мы прикрепили на нашу собранную ферму флаг США и отдали ему честь. Мы также называли себя Ace Construction Company.⁴

² Джордж Эбби (George Abbey) занимал пост руководителя Директората летных операций. По традиции он лично звонил отобранным в число астронавтов.

³ Здесь и далее в квадратных скобках — дополнения автора статьи.

⁴ Компания «Строители-асы»



Нашим девизом было: «Мы строим все, всегда, везде».

Когда мы вернулись внутрь, Вуди сказал: его руки настолько устали, что единственное, что он в силах сделать — это закрыть люк.

Я тоже устал. Мой охлаждающий костюм был полон конденсата. Но сильнее всего устал мой мозг. Во время ВКД⁵ я должен был все время думать на миллион миль в час. Я постоянно думал о том, что я буду сейчас делать, дважды проверяя то, что делаю, проверяя свой привязной фал, держал связь с остальным экипажем и с Землей, думал о том, что делает мой партнер. Все следовало делать осторожно; я не мог позволить моим мыслям блуждать. Так что физически я был утомлен, а ментально — просто истощен.

...После того, как я слетал на шаттле семь раз — каждый раз по различным программам — меня часто спрашивали, какой полет у меня был самым любимым. Я думаю, это все равно, что спросить у матери, кого из семи детей она

любит больше. Однако если спрашивающие настаивают, я могу ответить, что это — STS 61-B. Потому что это был мой первый полет, и потому что в нем я выполнил свои первые два выхода в открытый космос.

Полет второй: совершенно секретный

В мой второй полет Дэн Бранденстайн, тогда шеф Отдела астронавтов, поехал [на стартовую площадку] вместе с нами. «Астронавт»⁶ остановился в предусмотренной точке, чтобы он смог выйти и вылететь на самолете NASA на разведку погоды. Когда Дэн встал, он сказал, что хотел бы помолиться с нами. Я подумал, что это было бы действительно неплохо, кивнул и смежил веки, ожидая услышать его проникновенные слова. Я нередко возносил молитвы, и сейчас мне это было по душе.

⁵ Внекорабельная деятельность, выход в открытый космос (англ. Extravehicular Activity, EVA).

⁶ Микроавтобус, использовавшийся для доставки астронавтов на стартовую площадку.

Дэн сделал паузу и сказал: «Да поможет вам Бог, если вы напортачите. Аминь». И все! Он вышел. Мы оглушительно захахотали. Разумеется, мы знали, что он имеет в виду.

Миссия STS-27 была засекреченной, и это сильно усложняло наши приготовления. Когда мы прибывали на тренировку, порядок предусматривал «дезинфекцию». Это означало, что весь процесс удлинялся, только определенные секретари и прочий персонал с допуском мог попасть на тренировки, координировать их или просто за ними наблюдать.

Тренировки указывались в расписании с помощью кодов. Если вы хотели знать, что будет на той или иной тренировке, вам следовало открыть сейф и по карточкам внутри преобразовать код в расписании в нормальный язык. Все наши чек-листы, полетные планы и процедуры были расписаны в секретных документах, которые хранились в сейфах и тщательно пересчитывались всякий раз, когда тренировка завершалась.

Места наших тренировок, включавшие гигантские тренажеры типа бассейна гидроневесомости, проверялись на отсутствие электронных «жучков» всякий раз, когда мы ими пользовались. Двери запирались и окна занавешивались. Компьютеры в тренажерах «сбрасывались» и тщательно очищались после тренировки, чтобы после того, как мы уходили, в них не оставалось никакой секретной информации.

Запланированное время старта, высота и наклонение орбиты, плановая длительность миссии не разглашались. Фактические параметры [орбиты] были установлены наблюдателями-любителями уже в ходе полета.

...Наш экипаж не мог использовать стандартную форму для съемки фильма об STS-27. Вместо этого мы снимали эпизоды, где показывалось что угодно, кроме того, что мы действительно делали в этом полете. Мы должны были быть уверены, что не показали в фильме никакого секретного оборудования в кабине шаттла или в отсеке полезной нагрузки.⁷ Посему наш послеполетный фильм включал множество сцен обычной жизни в космосе — приготовление и прием пищи, бритье и купание с помощью губок... Реальный послеполетный фильм был засекреченный.

...После того, как секретный фильм был закончен, специальный курьер увез его в Вашингтон. Наш экипаж первую остановку сделал в Пентагоне, где мы продемонстрировали фильм членам Объединенного комитета начальников штабов. В конце нашего выступления командующие видами Вооруженных сил стоя аплодировали нам — неплохое начало дня!

...Позже, в ходе нашего визита в Вашингтон, мы побывали в штаб-квартире ЦРУ. Его директор Уильям Вебстер вручил каждому из нас по медали.⁸ При вручении наград нас сфотографировали, но фотографии заперли в сейф. Нам сказали, что в любое время, будучи в округе Колумбия, мы можем зайти и навестить наши медали... Только когда «холодная война» закончилась, мы получили по почте посылки, в которых была медаль, выписка из указа и наши фото с церемонии награждения.

...Надо сказать, что миссия STS-27 едва не завершилась трагедией. Мы с большой вероятностью могли закончить свои жизни так же, как Columbia в феврале 2003 г. Фактически наши повреждения в STS-27 были тяжелее, чем причиненные любому другому кораблю... На наше

⁷ Полезная нагрузка в полете STS-27 (спутник радиолокационной разведки Lacrosse-1) была официально рассекречена лишь в 2013 г. — ВПВ №2, 2009, стр. 27

⁸ «Медаль национальной разведки за достижения» (National Intelligence Medal of Achievement).

STS-27, 3-й полет шаттла Atlantis

Даты полета:	Продолжительность полета:
2-6 декабря 1988 г.	4 суток 9 часов 5 минут
Командир	Роберт Л. Гибсон (Robert Lee Gibson)
Пилот	Гай С. Гарднер (Guy Spence Gardner)
Полетные специалисты	Ричард М. Малейн (Richard M. Mullane) Джерри Л. Росс Уильям М. Шеперд (William Shepherd)
Основная полезная нагрузка	Спутники Morelos-B, Satcom KU-2, AUSSAT-2



▲ Приземление шаттла Atlantis после миссии STS-27. Хорошо видны повреждения теплозащитного покрытия в передней части корабля.



▲ Администратор NASA Джим Флетчер (Jim Fletcher) изучает критические повреждения шаттла Atlantis после завершения миссии STS-27. Этот полет — всего лишь второй после гибели корабля Challenger — также вполне мог закончиться трагически, что, по мнению многих экспертов, поставило бы крест на всей программе «космических челноков».

счастье и счастье программы, они пришли на места с двойной толщиной металла, и этого оказалось достаточно для нашей защиты и предотвращения прорыва раскаленных газов через алюминиевую обшивку корабля.

* * *

В 1990 г. отсрочка старта по программе STS-37 обернулась для Росса неожиданной поездкой в СССР. «Холодная

война» едва успела стихнуть, и эта поездка была для американцев сродни путешествию на другую, совсем незнакомую планету.

В конце 1989 г. советская фракция АУКП⁹ предложила американской фракции прислать четверых астронавтов в Москву с двухнедельным визитом для посещения советских космических объектов. Для этого были выбраны бывший астронавт и тогдашний замдиректора JSC¹⁰ Пол Вейц, глава Отдела астронавтов Дэн Бранденстайн, опытный командир шаттла Рон Грэйб и я. Это был единственный случай, когда я радовался переносу старта.

Мы прибыли в Москву 9 февраля 1990 г. Москва выглядела серой, холодной, с низко нависшими облаками... Складывая чемоданы [дома], я заметил, что не имею теплой зимней шапки. Я решил подождать прибытия в Москву, чтобы купить ее. Где может быть лучшее место для покупки зимней шапки? Явно не в Хьюстоне.

Бывшие космонавты — генерал Владимир Коваленок, Олег Макаров и Алексей Леонов — были главными хозяевами в ходе нашего визита. После оформления в отеле мы собирались в лобби, чтобы поехать на обед в дом генерала Леонова и [посетить] его художественную студию. Я объяснил Алексею свой план покупки шапки в Москве, и спросил, где это лучше сделать.

— No problem, — ответил он.

Мы загрузились в напоминавшую мини-вэн машину и отправились в центр города. В конце концов, мы подъехали к фасаду большого, серого, тяжелого на вид здания в центре Москвы. Люди, одетые по-военному, входили и выходили из него. Наша машина небрежно припарковалась прямо перед дверями... Сразу стало ясно, что это не какой-нибудь заурядный Macy's.¹¹ Мы были в магазине одежды Красной Армии!¹² Ведомые двумя генералами, мы все промаршировали внутрь. Поднявшись по лестнице, подошли к витрине с шапками. Не зная русского языка, я все равно понял суть заказа, сделанного генералом девушке за прилавком: «Дайте всем нашим американским друзьям шапки!».

Вероятно, девушка опасалась иметь дело со столь странным заказом двух генералов. Она захотела прежде поговорить со своим менеджером. Но генералы не желали ждать. После некоторой «дискуссии» и размахивания руками вся американская делегация, включая меня, получила новые, очень теплые советские военные шапки.

Посетили американцы и Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

...Американские пилоты-астронавты были приглашены «полетать» на тренажере «Союза», а я спросил, нет ли возможности померить советский выходной скафандр. Это удалось устроить, и я был взволнован возможностью получить информацию о нем из первых рук. Я занимался со скафандром до обеда и нашел в их версии выгодные и невыгодные особенности в смысле подгонки. Их скафандр проще надевать и снимать, но он жестче и тяжелее для работы в нем. Подвижность рукавов и эластичность перчаток были заметно хуже наших.

После обеда я получил небольшой сюрприз. Из предшествовавшего обсуждения русские эксперты по ВКД

уловили, что я участвовал в разработке ракетного ранца MMU.¹³ За тот час, что мы обедали, они устроили мне возможность «полетать» на имитаторе их версии MMU, которую они называли «космическим мотоциклом»... Я снова надел скафандр, и меня прикрепили спиной к установке... Мне показалось, что их версия MMU тяжелее для полета, чем наша — прежде всего потому, что всегда привязана фалом к конструкции [орбитальной станции].

На космодроме Байконур астронавты присутствовали при запуске космического корабля «Союз ТМ-9».

Позже в этот же день мы были приглашены на вечеринку в ознаменование успешного запуска «Союза»... Я сидел во главе стола, рядом с генералом Леоновым, который был ведущим вечера... Для меня было большой честью находиться рядом с ним.

Вскоре после того, как были поданы блюда и напитки, я понял, что мне следует как можно скорее встать и проповедовать тост, пока я еще на это способен. Я немедленно начал вставать, но и генерал Леонов тоже встал. На мое счастье, генерал довольно хорошо понимал английский и обладал завидным чувством юмора.

Я повернулся к нему и сказал: «Генерал, вы должны сесть. Я хочу сказать тост. — Я сделал паузу, а потом продолжил: — А если вы не дадите мне этого сделать сейчас, позже я уже не смогу встать или говорить». Алексей засмеялся, улыбнулся своей светлой улыбкой и объяснил всем гостям по-русски, что я сказал. Когда смех утих, я произнес перед американцами и русскими очень неплохой тост!

Полет третий: незапланированный выход

После нескольких отсрочек *Atlantis* все-таки стартовал.

Запуск гамма-обсерватории Compton был запланирован на третий день нашей миссии... И, конечно, антенна спутника не раскрылась. Она застряла... Пока предпринималась вторая попытка освободить antennу, я снял свое обручальное кольцо и посмотрел на Стива [Найджела]. «Пойду-ка я вниз, готовиться к ВКД», — сказал я ему. «Думаю, ты правильно поступаешь», — согласился он.

STS-37, 8-й полет шаттла <i>Atlantis</i>	
Даты полета:	Продолжительность полета:
5-11 апреля 1991 г.	5 суток 23 часа 32 минуты
Командир	Стивен Р. Найджел (Steven Ray Nagel)
Пилот	Кеннет Д. Кэмерон (Kenneth Cameron)
Полетные специалисты	Линда М. Гудвин (Linda Maxine Godwin) Джерри Л. Росс Джером Эпт (Jerome III «Jay» Apt)
Основная полезная нагрузка	Спутник-обсерватория GRO (Compton) ¹⁴

Это был мой третий выход и первая моя незапланированная работа в открытом космосе. Я немного нервничал. Если мы не сможем отремонтировать обсерваторию стоимостью 760 млн долларов, то получим очень большой и очень дорогой кусок космического мусора.

Когда Джей [Эпт] и я вышли из шлюзовой камеры, я попросил Линду [Гудвин] подвести обсерваторию пониже и

⁹ Ассоциация участников космических полетов.

¹⁰ Космический центр имени Джонсона.

¹¹ Одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США.


¹² Центральный военный универмаг («Военторг»).

¹³ Устройство для маневрирования астронавта в открытом космосе (англ. Manned Maneuvering Unit).

¹⁴ ВПВ №7, 2008, стр. 7



▼ Запуск гамма-обсерватории Комптона (Compton Gamma Ray Observatory) с борта шаттла Atlantis.



NASA/MSFC

▲ «После того, как мы отремонтировали спутник [Compton], и перед тем, как его отпустили в свободный полет, я приблизился к большому окну, выходящему с задней части полетной палубы в отсек полезной нагрузки. Стив Нэйджел сделал три фото, на которых я с улыбкой смотрю через окно. Первое и третье не получились, зато второе вышло здорово. Оно было напечатано во множестве журналов... Несколько лет мое фото из миссии STS-37 встречало прибывающих в международный аэропорт Орландо» (из воспоминаний Джерри Росса).

поближе к правому борту отсека полезной нагрузки. Линда, управляя манипулятором, привела спутник в нужную позицию. Тогда я наметил путь, по которому мог пройти туда, где смонтирована антенна.

Большие топливные баки спутника находились прямо напротив меня, и я знал, что должен быть очень внимательным, чтобы не пробить их или как-то не повредить. Я осторожно проделал свой путь к задней стороне обсерватории и добрался до антennы. Проверил корпус и защелку, насколько было можно, и доложил экипажу и Центру управления, что не наблюдаю очевидных причин заклинивания.

...Держась левой рукой за корпус обсерватории, я дотянулся правой рукой и дал антенне два примерно 40-фунтовых¹⁵ толчка. Антenna не сдвинулась. Я нажал третий и четвертый раз, и она шевельнулась немнога. Наконец, с пятым и шестым толчком, она качнулась свободно! Затем Джей и я полностью раскрыли антенну и зафиксировали ее в орбитальной позиции. Я почувствовал большое облегчение и про себя ликовал. Остальной экипаж тоже был взволнован, и у наземной команды поднялось настроение... И это заняло всего 17 минут!

Когда мы вернулись внутрь после ВКД, Джей снял свои перчатки и обнаружил большой кровавый синяк на руке. Я решил, что у него лопнул мозольный волдырь. Но выяснилось, что металлическая деталь его перчатки проткнула оболочку и натерла кожу. К счастью, оболочка была такой прочной, что деталь не причинила ущерба скафандру. Нам повезло...

После миссии Джей и я пришли в комнату, заполненную инженерами и менеджерами Центра космических полетов имени Годдарда, отвечавшими за GRO, чтобы выступить перед ними. У меня был припасен красный вымпел с надписью: «Удалить перед полетом». Мы сыграли так, будто нашли этот вымпел на антenne, с которой они забыли его снять, что привело к отказу при раскрытии. Когда я бросил вым-

пел на стол и спросил, хотят ли они получить его обратно, на лицах инженеров и менеджеров застыла нелепая гримаса: думаю, некоторым из них хотелось провалиться на месте. Эффект получился настолько драматичным, что мы тут же широко заулыбались и уверили их, что это просто шутка.

Полет четвертый: в интересах Германии

На пути от Апартаментов экипажей¹⁶ к пусковой площадке «астровэн» всегда останавливался у Центра управления полетом, где представитель начальства высаживался. Подозреваю, что некоторые из них с удовольствием поехали бы с экипажем дальше.

Иногда, когда «астровэн» замедлял ход, один из менеджеров делал паузу, осматривал экипаж и небрежно говорил: «Я должен сбрасывать ваши посадочные талоны, чтобы пропустить вас на стартовую площадку». Опытные члены экипажа лезли в карманы своих скафандров и доставали

STS-55, 14-й полет шаттла Columbia

Даты полета: 26 апреля – 6 мая 1993 г.	Продолжительность полета: 9 суток 23 часа 40 минут
Командир	Стiven Р. Нэйджел
Пилот	Теренс Т. Хенрикс (Terence Henricks)
Полетные специалисты	Джерри Л. Росс Чарлз Дж. Прекурт (Charles Precourt) Бернард Э. Харрис (Bernard Harris, Jr)
Специалисты по полезной нагрузке	Ульрих Вальтер (Ulrich Walter), Германия Ханс-Вильгельм Шлегель (Hans Wilhelm Schlegel), Германия
Основная полезная нагрузка	Лаборатория Spacelab D-2

¹⁵ Чуть больше 18 кг.

¹⁶ Апартаменты, где астронавты находились в карантине накануне полета (Astronaut Crew Quarters).

Вид на лабораторию Spacelab D-2 из кабины шаттла в полете STS-55.



вполне реальные, официально выглядящие шаттловские «посадочные талоны». Новички впадали в панику и торопливо начинали шарить по карманам в поисках талонов, о существовании которых услышали впервые в жизни.

Ветераны смотрели на них весело и старались как можно дольше не расхочатся. Обычно это продолжалось недолго. В конце концов, новички замечали улыбки и взрывались смехом сами, поняв, что над ними подшутили. Это было прекрасным розыгрышем и помогало снять напряжение перед стартом.

...Но, по правде говоря, получение «посадочного талона» для рейса на шаттле было непростым процессом. Неожиданно для меня весной 1991 г., еще до миссии STS-37, я получил назначение в другой полет — до того, как отправился в тот, к которому готовился.

Дэн Бранденстайн, шеф Отдела астронавтов и инициатор памятной молитвы перед STS-27, позвонил мне, когда я был в карантине перед полетом с GRO... Он хотел, чтобы я полетел в качестве руководителя работ с полезной нагрузкой¹⁷ в спонсируемой Германией миссии Spacelab D-2.¹⁸

Правительство ФРГ закупило полет и запланировало свои эксперименты. Позже, чтобы снизить его стоимость, оно продало некоторую часть полетного времени и объема в отсеках Европейскому космическому агентству и NASA. Два этих агентства добавили свои эксперименты, но и немцы своих не убавили, что стало хроническим источником проблем при подготовке полета. Руководитель миссии оказался между молотом и наковальней, пытаясь удовлетворить [запросы] своего начальства, а также германского, ESA и NASA. В результате проблемы «стекали» ниже — к экипажу, и, разумеется, ко мне как к руководителю работ с полезной нагрузкой.

¹⁷ Англ. Payload Commander, PC.

¹⁸ Герметичная исследовательская лаборатория, устанавливаемая в отсеке полезной нагрузки шаттла (вторая подобная лаборатория, созданная ФРГ).

На орбите, наряду с напряженной работой, находилось место и излюбленным розыгрышам.

Стив [Найджел] знал, как я люблю смотреть из окна корабля на Землю. Он также знал, что я буду крайне занят, и что Spacelab не имеет иллюминаторов. Чтобы подразнить меня, он перед полетом добыл копию фотографии из STS-37, где я [из открытого космоса] заглядываю в одно из задних окон летной палубы, и приделал его за крышкой на том же самом окне [шаттла] Columbia. Стив знал, что я сниму крышку, когда мы будем готовиться к открытию створок отсека полезной нагрузки вскоре после выхода на орбиту.

Его план сработал превосходно. Ничего не подозревая, я снял крышку и столкнулся лицом к лицу со своей же физиономией, смотрящей на меня. Я разразился хохотом. Он меня «сделал!» Потом Стив унес фото в Spacelab и прикрепил его на задней стенке лаборатории. Он сказал, что теперь я могу притворяться, будто у меня есть окно. Ну для чего еще нужны друзья?!

Полет пятый: посещение «Мира»

«Мир» был большой многомодульной станцией и имел солнечные батареи повсюду снаружи. Когда мы вошли в «Мир», то были удивлены отсутствием неприятного запаха. Тем не менее, нам казалось, что мы попали в какой-то переполненный шкаф...

Экипаж на борту «Мира» включал командира Юрия Гидзенко, которого я знал по своему первому визиту в Советский Союз в 1990 г., когда он тренировался как кандидат в космонавты. Другими членами экипажа были русский Сергей Авдеев и немец Томас Райтер, которого я встречал, когда готовился к миссии Spacelab D-2.

STS-74, 15-й полет шаттла Atlantis	
Даты полета:	Продолжительность полета:
12-20 ноября 1995 г.	8 суток 4 часа 30 минут
Командир	Кеннет Д. Кэмерон
Пилот	Джеймс Д. Хэлслел (James Halsell)
Полетные специалисты	Кристофер А. Хэдфилд (Chris Austin Hadfield), Канада Джерри Л. Росс Уильям С. МакАртур (William McArthur)
Основная полезная нагрузка	Стыковочный отсек 316ГК для комплекса «Мир»

Наш экипаж привез кое-какой багаж на «Мир». Мы остались вещи для американской астронавтки Шенон Люсида, которая вскоре должна была совершить длительный полет на станции. Шенон любила яркие цветные носки «неоновых» расцветок. Мы привезли несколько пар и запрятали их в глубине вещей, чтобы она нашла их в качестве сюрприза, как пасхальные яйца. Я обнаружил, что Юрий Гидзенко любит американскую музыку «кантри», и подарил ему одну из моих аудиокассет с такой музыкой.

Полет шестой: начало сборки МКС

Так случилось, что Джерри Росс ответил отказом на предложение дублировать Дэвида Вулфа в длительном полете на станции «Мир».

...Но Боб [Кабана]¹⁹ не держал на меня зла. Фактически через 6 месяцев после этого он назначил меня в STS-88 —

¹⁹ Глава Отдела астронавтов в тот период.

STS-88, 13-й полет шаттла Endeavour

Даты полета: 4 - 16 декабря 1998 г.	Продолжительность полета: 11 суток 19 часов 17 минут
Командир	Роберт Д. Кабана (Robert Donald Cabana)
Пилот	Фредерик У. Стеркоу (Frederick Wilford Sturckow)
Полетные специалисты	Джерри Л. Росс Нэнси Дж. Керри (Nancy Jane Currie) Джеймс Х. Ньюман (James Hansen Newman) Сергей Константинович Крикалев, Россия
Основная полезная нагрузка	Модуль Unity для Международной космической станции

миссию, с которой началась сборка МКС. Я снова должен буду работать в открытом космосе. И вместо двух ВКД, как в предыдущих миссиях, мы выполним три.

Когда я попал в [экипаж] STS-88, я стал лишь третьим астронавтом, назначенным в шестой полет. Первым был Джон Янг, и никто еще ни разу не летал семь раз. Я был одним из самых опытных астронавтов NASA. Проблема с опытом в том, что он приходит с возрастом...

Согласитесь, порой слово «опытный» — это лишь вежливая форма слова «старый». Я оглядывался вокруг в Отделе астронавтов и убеждался, что он полон гораздо более молодых людей, которые начали подшучивать над моей «опытностью». «Эй, это похоже на времена Mercury?» — спрашивали они. Они хотели знать, действительно ли я состоялся за право совершить первый космический полет. Они интересовались, какой из моих полетов на Gemini (!) понравился мне больше всего. «Си-Джей» [Рик Стеркоу] особенно старательно меня подразнивал и был от этих шуток в восторге.

Космонавт Сергей Крикалев из Российского космического агентства присоединился к тренировкам экипажа позже... Для Сергея это был четвертый полет, включая 15-месячное пребывание на «Мире». Вдобавок ко всему, его присутствие сделало для нас работу с русскими более простой.

Разница между американской и русской культурой была интересной. Прежде всего, русские инженеры казались молчаливыми, замкнутыми и обычно не готовыми поделиться информацией. Первым ответом на наши вопросы почти всегда было «Нет». Иногда это было «Может быть». И очень редко они говорили «Да».

Русские также по-другому относились ко времени... Они не имели некоего внутреннего хронометра, как американцы, которые говорят: «У меня есть еще 5 минут, чтобы это закончить». Наши тренировки и приготовления были связаны с графиком, но русским не казалось, что они должны действовать по-разному в зависимости от того, есть ли у них пять минут или две недели. Сергей весьма почтился в российском космическом сообществе, и мы увидели разницу в совместной работе, когда он подключился к экипажу. Он понимал и нас, и своих соотечественников.

После выхода на орбиту Endeavour пристыковал модуль Unity кроссийскому функционально-грузовому блоку «Заря», запущенному ранее с Байконура. Это стало нача-



Endeavour пристыковал модуль Unity к функционально-грузовому блоку «Заря».

лом грандиозного космического проекта — сборки Международной космической станции.

...Наша вторая ВКД состоялась на седьмой день полета, и это был тоже семичасовой выход. Две антенны «Зари» не раскрылись автоматически, как требовалось — они застряли в сложенной конфигурации. Мы вручную открыли одну из российских антенн с помощью металлического штыря. Вторую мы освободили во время следующего выхода.²⁰

На 8-й день полета, 10 декабря, свершилось историческое событие. Боб и Сергей перешли из шаттла в МКС. Впервые люди сделали это в космосе. Как только Сергей вошел в российский модуль, он понял: что-то не в порядке. «Какой-то шум не такой. Слишком тихо», — сказал он, и был прав. Сергей обнаружил в одном из воздуховодов куски пластика, серьезно перекрывавшие поток воздуха.

Наш третий и последний выход в открытый космос состоялся на 10-й день полета... Когда мы были там, я обнаружил проблему с двумя российскими экспериментальными установками на внешней стороне «Зари». Они почти свободно плавали у своих монтажных мест, и я попросил разрешения закрепить их. Русским потребовалось очень много времени, чтобы дать нам ответ, но, в конце концов, они сказали: «Да». Славно. Я бы давно уже мог прикрутить их.

Полет завершился полным успехом. Но что дальше?

Итак, я слетал шесть раз. Столько же летали еще трое других... но ни один не слетал больше. В Отделе астронавтов было много нового народу, ожидающего шанса отправиться на орбиту, а я был относительно старым (в терминах астронавтов). Мне исполнилось 50.

Хуже того, в Отделе существовало общее мнение: NASA не даст никому слетать больше, чем летал Джон Янг. На его счету было 6 миссий в трех программах: две в проекте Gemini, две в программе Apollo и две в программе Space Shuttle.²¹

...В тот период мой бывший коллега по экипажу STS-55 Чарли Прекорт занимал пост шефа Отдела астронавтов. Вернувшись домой после STS-88, я зашел в его кабинет —

²⁰ Антенны системы телепрограммного ручного управления (TOPU).

²¹ ВПВ №9, 2006, стр. 4

выяснить, держится ли NASA за пресловутый «стеклянный потолок» Джона Янга.

Чарли сказал, что не знает ни о каком запрете, и я попросил его выяснить это у м-ра Эбби. Я хотел знать, есть ли что-то, не позволяющее астронавту слетать больше шести раз. Чарли вернулся и сказал мне, что никакого «потолка» не существует. Я ответил ему, что не буду уходить из Отдела и попробую слетать еще... Увидев группу свежеиспеченных астронавтов, входящих в дверь, я понял, что мои дни сочтены. Но все же я хотел попытаться.


Полет седьмой: ферма для МКС

Однажды в полдень в начале 2001 г. я был дома. Я только что вернулся с Мыса [Канаверал] после запуска, и собирался немного повозиться вокруг дома. Зазвонил телефон. Звонили из Отдела астронавтов, меня просили прибыть в JSC.

Чарли [Прекурт] приветствовал меня, когда я вошел в его кабинет, и не стал тратить лишних слов. Он сказал, что

STS-110, 25-й полет шаттла Atlantis	
Даты полета: 8-19 апреля 2002 г.	Продолжительность полета: 10 суток 19 часов 42 минуты
Командир	Майкл Дж. Блумфилд (Michael John Bloomfield)
Пилот	Стивен Н. Фрик (Stephen Frick)
Полетные специалисты	Рекс Дж. Уолхейм (Rex Joseph Walheim) Элен Л. Очоа (Ellen Lauri Ochoa) Ли М. Морин (Lee Miller Morin) Джерри Л. Росс Стивен Л. Смит (Steven Lee Smith)
Основная полезная нагрузка	Ферма S0

▼ Джерри Росс с флагом-баннером, который ему преподнес командир шаттла в ходе миссии STS-110 Майкл Блумфилд. На баннере размещены эмблемы всех семи полетов Росса. Фото сделано в модуле Destiny (МКС).



меня назначают в миссию STS-110. Мое сердце подпринуло. Это был полет по сборке МКС, так что у меня появилась возможность вернуться в космос и выполнить еще две ВКД. Я поблагодарил Чарли за прекрасные новости. Когда я выходил из его кабинета, остальной экипаж выстроился у дверей и поздравил меня с назначением.

...У астронавтов мало традиций; однако большинство из них проходят комнату одевания скафандров в Апартаментах экипажа в KSC²² перед выходом для поездки на стартовую площадку. Я не знаю, откуда пошла эта традиция, но это началось где-то после STS-26²³ и существовало все «шаттловские» годы. Может показаться странным, что экипажи играют в покер прямо перед полетом, но они часто делают это. Менеджер NASA сдает карты членам экипажа — каждому по пять карт — и они играют в очень своеобразную модификацию покера под названием Possum Fargo. Участник с наихудшим набором карт выбывает. Посматривая на часы, остальные играют, пока самые плохие карты не окажутся у командира. Только тогда, когда самое большое «командирское невезение» на этот день уже «израсходовано», экипаж снимается с места и выдвигается на стартовую площадку.

...Когда заработали твердотопливные ускорители, шаттл оторвался от Земли. Стив Смит и я сидели бок о бок на средней палубе. В этот момент я стал первым человеком в истории, стартовавшим в космос семь раз.²⁴ Но в этом запуске я не почувствовал ничего особенного, что бы отличало его от других.

Я надеюсь, что этот мой рекорд будет побит, и надеюсь — побит американцем. Хотя нынешнее состояние pilotируемой космонавтики таково, что, похоже, это случится не скоро...

Последний выход Джерри в открытый космос 16 апреля 2002 г. был для него по понятной причине особо волнующим.

...Под моими ногами расстипалось Средиземное море, и я двигался над ним в восточном направлении со скоростью 5 миль в секунду. Когда мы проходили над зеленой, плодородной дельтой Нила, солнце окрасило горизонт над закругляющимся силуэтом Земли красным, оранжевым, желтым и сиреневым цветом. Выключив фонари на своем шлеме и подняв светофильтр, я разглядел звезды и увидел грозу над Израилем и Ливаном.

...Я бросил прощальный взгляд на МКС, на шаттл, посмотрел на божественно прекрасную Землю. Неохотно вошел в шлюзовую камеру и закончил мой последний выход в открытый космос. Это был печальный момент.

На долю Джерри выпало опекать семьи погибших астронавтов шаттла *Columbia* в день трагедии, а потом разыскивать обломки космического корабля, упавшие на Землю.


Через 9 месяцев²⁵ после моей седьмой миссии шаттла *Columbia* разрушился за 15 минут до посадки, семь человек погибли. Я ждал приземления на посадочной полосе в KSC, ожидая возможности поздравить экипаж и всех друзей, когда мне дадут слово.

²² Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал (Kennedy Spaceflight Center).

²³ Первый полет после катастрофы шаттла *Challenger* в 1988 г.

²⁴ Через 2 месяца и 3 дня его «догнал» Франклин Чанг-Диаз (Franklin Chang Diaz), тоже стартовавший в седьмой раз.

²⁵ 1 февраля 2003 г.



▲ Джерри Росс в ходе своего последнего выхода в открытый космос на Международной космической станции 16 апреля 2002 г.

...[Перед этим] я получил должность в качестве шефа Отдела комплексных испытаний шаттлов. Работа включала руководство деятельностью Апартаментов экипажей в KSC и заботу об экипажах, находящихся на Мысе перед запуском и после посадки. Миссия Columbia STS-107 была первым полетом с того момента, как я занял новую должность.

Джерри узнал о разразившейся трагедии одним из первых. Выйдя из микроавтобуса, я произнес короткую молитву по душам моих друзей, а потом позвонил астронавтам, составлявшим эскорт семей членов экипажа. Я сказал им, что мы утратили контакт с кораблем, и они должны привезти членов семей в Апартаменты экипажей как можно скорее. Семьи, выйдя из автобуса, стояли рядом с посадочной полосой, ожидая посадки, и сбрасывать их вместе было непросто. Им не говорили, что произошло, но взрослые могли все понять по распоряжениям сопровождающих и по выражению их лиц.

Мы собрали семьи обратно в автобус, и когда они прибыли, я помог проводить их в конференц-зал. Я уже видел по ТВ видеозапись разрушения шаттла над Техасом и мчащиеся по небу осколки, но ничего не сказал. Члены семей были в состоянии шока. Они спрашивали, что мне известно, и я отвечал: NASA пытается выяснить, что произошло. Я засел за телефон и взялся за организацию перелета семей обратно в Хьюстон. Наконец Боб Кабана пришел в мой кабинет и сказал, что получил достаточно информации, и что мы должны поговорить с членами семей.

Мы вошли в конференц-зал, где ждали родные астронавтов. Все смотрели на нас, и Боб мягко, как мог, сказал им, что экипаж погиб. Корабль разрушился на этапе снижения, и маловероятно, чтобы кто-то выжил. Мы делали все, что могли, чтобы как-то утешить семьи.

...По дороге обратно в Апартаменты, где мы должны были бы праздновать с ликующим экипажем и их счастливыми близкими, я съехал на обочину и вышел из машины. Я плакал.

По поручению администратора NASA Росс руководил поисками обломков корабля Columbia в штате Техас.

Начальные операции были направлены на поиски [останков] экипажа, и я этим не занимался. Восемь других астронавтов помогали в поисках [останков] и препровождении их в морг. Поисковые команды... в целом выполнили эту печальную миссию с большой чуткостью и почтительностью.

...Астронавт Джон Грунфельд и я рассчитали примерную линию падения обломков, которую использовали для сопре-



▲ Посадка шаттла Atlantis 19 апреля 2002 г. – последние метры космического пути Джерри Росса.

доточения наших поисков... Мы нашли несколько кассет с видеосъемкой, которую сам экипаж сделал на орбите... Я был рад, что мы нашли это видео. Имелось много спекуляций по поводу того, что NASA будто бы нашла видео экипажа, на котором якобы снят момент разрушения шаттла, но это неправда. NASA опубликовала все, что было найдено.

Личные вещи экипажа видеть было тяжело. Любые личные предметы или одежда поступали ко мне для специального оформления... Вещи попадали к нам скрученными, обугленными, испачканными, но я всегда знал, что именно это за предметы.

Кто-то даже нашел, по его словам, «маленького желтого динозавра с лиловыми пятнами». Я полностью просмотрел полетный манифест,²⁶ но игрушечного динозавра среди вещей, которые экипаж взял с собой, не обнаружил. Я сказал нашедшему, что это не наше, но он все равно прислал его нам. Динозавр стал талисманом сотрудников ангара в KSC, раскладывавших там обломки [шаттла]. В конечном итоге он дважды слетал в космос — в качестве талисмана экипажей STS-114 и STS-130. STS-114 был первым полетом после катастрофы, и для меня много значило увидеть нашего «маленького друга» на борту шаттла вместе с Айлин Коллинз и ее экипажем. Сейчас динозавр молчаливо охраняет обломки корабля Columbia в Здании сборки системы в KSC.

...20 января 2012 г., в мой 64-й день рождения, я покинул NASA.

Джерри Росс провел на орбите 58 суток, 1 час и 1 минуту, а также выполнил 9 выходов в открытый космос общей продолжительностью 58 часов 14 минут. Сейчас он на пенсии — пишет книги и выступает с лекциями.

²⁶ Список предметов, взятых на борт.

2011

2012


цена
80 грн.

**Архив журнала за 2011 и 2012 гг.
в цифровом виде**


Коллекция журналов на CD-дисках.

Скоро в продаже диски с коллекциями за 2003-2010 гг.

НЕБЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ



Видимый путь кометы Лавджоя (C/2013R1 Lovejoy) в январе-феврале 2014 г.



Видимый путь астероида Паллада (2 Pallas) в январе-марте 2014 г.

МЕСЯЦ АСТЕРОИДОВ.

Покрытия малыми планетами звезд, видимых невооруженным глазом, происходят не так уж часто, и еще реже они доступны наблюдениям в густонаселенных местностях. Тем интереснее будет увидеть явление, которое произойдет в ночь с 3 на 4 февраля, когда 17-километровый астероид Домото (4975 Dohmoto) примерно на полторы секунды заслонит звезду 5-й величины HIP 53273 вблизи границы созвездий Льва и Секстанта. Больше всего шансов увидеть редкую оккультизацию имеют те, кто в эту ночь окажется в полосе, проходящей от Индокитая через Центральную Азию, Западный Казахстан, Нижнее Поволжье до Беларуси и севера Польши.

В конце февраля пройдет конфигурацию противостояния крупнейший астероид и второй по величине объект главного пояса — 700-километровая Паллада (2 Pallas). Двумя с половиной месяцами ранее она проследовала перигелий (ближайшую к Солнцу точку своей орбиты), поэтому ее текущая оппозиция будет одной из наиболее близких к Земле.

Следующее подобное сближение ожидается только в 2051 г. Видимый блеск Паллады в последнюю неделю февраля превысит 7-ю звездную величину.

По-прежнему достаточно яркой (около 9-й величины) может быть комета Лавджоя (C/2013R1 Lovejoy),¹ перемещающаяся по созвездиям Змееносца и Змеи. Ее лучше всего наблюдать в предрасветные часы.

ВИДИМОСТЬ БОЛЬШИХ ПЛАНЕТ.

«Королем небосвода» в феврале по-прежнему будет Юпитер. Он поднимается над горизонтом еще до захода Солнца и остается на небе почти до рассвета. Во второй половине ночи виден Марс, постепенно улучшаются условия утренней видимости Сатурна и Венеры.

Вскоре после окончания вечерних сумерек невысоко над западным горизонтом можно найти Уран. В солнечных лучах «прячутся» Меркурий и Нептун: первый в середине месяца проходит конфигурацию нижнего соединения, второй — верхнего.

¹ ВПВ №11, 2013, стр. 38


ПЕРЕКИДНОЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2014 г.
www.shop.universemagazine.com

КАЛЕНДАРЬ АСТРОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ (ФЕВРАЛЬ 2014 Г.)

- 1 5^h Луна ($\Phi=0,03$) в 3° севернее Меркурия (-0,5^m)
- 10^h Луна ($\Phi=0,04$) в 4° севернее Нептуна (8,0^m)
- 21:40-21:43 Астероид Гота (1346 Gotha, 14,7^m) закрывает звезду HIP 48004 (8,4^m). Зона видимости: Армения, Грузия, Черноморское побережье РФ, северо-восток Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Волынской обл., центральная часть Ровенской обл., юго-запад Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской областей, а также Беларусь
- 2 16:06-16:13 Астероид Гота (1049 Gotha, 15,3^m) закрывает звезду TYC 2900-45 (8,4^m). Зона видимости: полоса от полуострова Канин Нос (РФ) до полуострова Мангышлак (Казахстан) и восточного побережья Каспийского моря
- 3 19:55-20:00 Астероид Домото (4975 Dohmoto, 14,7^m) закрывает звезду HIP 53273 (5,5^m). Зона видимости: Узбекистан, юго-восток Таджикистана и Казахстана, Астраханская, юг Волгоградской и Воронежской, север Ростовской, юго-запад Белгородской областей РФ, север Сумской и Черниговской областей Украины, центр Гомельской, север Брестской, юго-запад Минской и Гродненской областей Беларусь
- 23^h Луна ($\Phi=0,21$) в 2° севернее Урана (5,9^m)
- 6 7^h Меркурий (0,5^m) проходит конфигурацию стояния
- 19:22 Луна в фазе первой четверти
- 7 9:34-9:37 Астероид Тама (1089 Тама, 14,0^m) закрывает звезду TYC 1944-1849 (8,5^m). Зона видимости: юг Камчатки, север Сахалина, Хабаровский край, юг Амурской обл.
- 8 10^h Луна ($\Phi=0,67$) в 2° севернее Альдебарана (α Тельца, 0,8^m)
- 9 16-19^h Луна ($\Phi=0,77$) закрывает звезду 119 Тельца (4,3^m) для наблюдателей Украины (кроме южных областей), Беларусь, стран Балтии, европейской (кроме Кубани, Ставрополья,
- Северного Кавказа) и запада азиатской части РФ
- 11 6^h Луна ($\Phi=0,88$) в 6° южнее Юпитера (-2,4^m)
- 20-22^h Луна ($\Phi=0,91$) закрывает звезду λ Близнецов (3,6^m). Явление видно в Украине, Беларуси, Молдове, странах Балтии, на Южном Кавказе, в европейской части РФ, в Западной и Центральной Сибири, на западе Якутии, в Казахстане и Центральной Азии
- 12 5^h Луна ($\Phi=0,93$) в апогее (в 406230 км от центра Земли)
- 14 23:53 Полнолуние
- 15 9^h Луна ($\Phi=1,00$) в 5° южнее Регула (α Льва, 1,3^m)
- 20^h Меркурий в нижнем соединении, в 4° севернее Солнца
- 19 15^h Луна ($\Phi=0,80$) в 1° севернее Спика (α Девы, 1,0^m)
- 20^h Луна ($\Phi=0,78$) в 3° южнее Марса (-0,2^m)
- 21 21^h Луна ($\Phi=0,59$) в 1° южнее Сатурна (0,5^m)
- 22 17:15 Луна в фазе последней четверти
- 23 3^h Луна ($\Phi=0,45$) в 7° севернее Антареса (α Скорпиона, 1,0^m)
- 18^h Нептун в верхнем соединении, в 0,5° южнее Солнца
- 26 21-22^h Луна ($\Phi=0,16$) закрывает звезду ρ^1 Стрельца (3,9^m) для наблюдателей юго-востока азиатской части РФ
- 5^h Луна ($\Phi=0,14$) в 0,5° южнее Венеры (-4,6^m)
- Астероид Паллада (2 Pallas, 6,9^m) в противостоянии, в 1,232 а.е. (184 млн км) от Земли
- 27 20^h Луна ($\Phi=0,04$) в перигее (в 360438 км от центра Земли)
- 20^h Меркурий (1,0^m) проходит конфигурацию стояния
- 21^h Луна ($\Phi=0,03$) в 2° севернее Меркурия
- Максимум блеска долгопериодической переменной звезды R Водолея (5,8^m)

Время всемирное (UT)

CITY LIGHTS



City Lights — вращающийся глобус, демонстрирующий ночное освещение городов нашей планеты.

Постоянное вращение осуществляется автоматически при подключенном к зеркальной подставке источнике питания.

Глобус City Lights украсит любой интерьер — жилое помещение, офис, кабинет — где бы вы его не установили.

Размеры: диаметр глобуса — 25 см; зеркальной подставки — 14 см.

Работает от электросети.

Celestial Globe


Земля днем — созвездия ночью: два глобуса в одном!

Оптический датчик автоматически включает подсветку, когда в комнате темнеет, и на глобусе отображаются 88 созвездий.

Отличный «ночник» и уникальный инструмент для географов и астрономов.

Диаметр глобуса — 20 см.

Работает от электросети.





Первая четверть

19:22 UT 6 февраля



Полнолуние

23:53 UT 14 февраля



Последняя четверть

17:15 UT 22 февраля


Вид неба на 50° северной широты:
 1 февраля — в 23 часа местного времени;
 15 февраля — в 22 часа местного времени;
 28 февраля — в 21 час местного времени

Положения Луны даны на 20^h
 всемирного времени указанных дат

Условные обозначения:

- рассеянное звездное скопление
- ⊕ шаровое звездное скопление
- галактика
- 〃 диффузная туманность
- эклиптика
- небесный экватор

Положения планет на орbitах
 в феврале 2014 г.



Иллюстрации
Дмитрия Ардашева

**Видимость планет:**

- Меркурий** — не виден
- Венера** — утренняя
- Марс** — утренняя (условия благоприятные)
- Юпитер** — виден всю ночь
- Сатурн** — утренняя
- Уран** — вечерняя (условия неблагоприятные)
- Нептун** — не виден



СУПЕРТАЙФУНЫ • НАВОДНЕНИЯ • ПОЖАРЫ • СНЕГОПАДЫ

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ МИНУВШЕГО ГОДА

В ноябре Организация Объединенных Наций объявила, что 2013-й год был ознаменован целым рядом экстремальных природных явлений. По предварительным данным, обнародованным Всемирной метеорологической организацией (специализированным учреждением ООН), минувший год может стать одним из десяти самых теплых с начала регулярных измерений в 1850 г.

Средний уровень моря достиг нового рекорда в марте 2013 г. Он поднимался на 3,2 мм в год, что близко к показателю около 3 мм в год, наблюдавшемуся в течение десяти лет (с 2001 по 2010 г.), и вдвое выше зарегистрированного в XX веке (1,6 мм/год).

В большинстве регионов температуры были выше средних, особенно в Австралии, в Северной Америке, на северо-востоке Южной Америки, в Северной Африке и большей части Евразии.

Январь-сентябрь 2013 г. оказались бо-

лее теплыми, чем соответствующий период 2011 и 2012 гг., когда климатическое явление Ла-Нинья вызвало похолодание.

Ученые из Великобритании, США и других стран, работающие в области исследований климата, сформировали новый международный альянс с целью изучения экстремальных погодных явлений, чтобы определить, можно ли считать причиной природных катализмов глобальное потепление, вызванное антропогенными выбросами в атмосферу парниковых газов.

По мнению специалистов, сегодня уже невозможно просто утверждать, что экстремальные погодные явления «согласуются» с климатическими изменениями. Нужно понимать, насколько сильно и как именно глобальное повышение температуры в течение всего прошлого века привело к «экстремизму» погоды.

Обстановка, в которой зарождаются и развиваются бури и ураганы, изменилась

в результате жизнедеятельности человека. В частности, климат стал более теплым и влажным, чем он был 30-40 лет назад.

10 мая 2013 г. впервые в человеческой истории концентрация двуокиси углерода в атмосфере преодолела важный рубеж — 400 частей на миллион. В последний раз такое случалось несколько миллионов лет назад, когда Арктика была свободна ото льда, на месте Сахары простиралась саванна, а уровень моря превышал сегодняшний показатель на 40 м. Эта веха стала отрезвляющим напоминанием о том, что выбросы парниковых газов не уменьшаются, хотя очевидно, что сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов ведут к изменению относительно устойчивых климатических условий, в которых на протяжении тысячелетий процветала человеческая цивилизация.

В ушедшем году мир пережил немалое количество губительных природных катализмов.

Супертайфун «Хайян» на Филиппинах



Тайфун «Хайян» из космоса



Разрушения на Филиппинах, причиненные тайфуном.

В начале ноября над Филиппинами пронесся сильнейший тайфун «Хайян». Скорость ветра достигла рекордных 315 км/ч. Город Таклобана на острове Лейте был разрушен практи-


чески полностью: не осталось ни одного целого здания. Огромные волны сметали прибрежные деревни. Вырванные с корнями пальмы лежали в месиве из грязи, остатков домов и человече-

ских тел. Оставшиеся в живых собирались в банды, взламывали торговые центры и грабили их. Сотрудники ООН везли в пострадавшие районы еду и воду. Власти заявили, что количество жертв, вероят-

но, превысит 5 тыс. человек, и «Хайян» станет самым смертоносным в истории архипелага. В начале декабря чиновники подтвердили гибель 5719 человек, еще 1800 чисились пропавшими без вести.

СУПЕРТАЙФУНЫ • НАВОДНЕНИЯ • ПОЖАРЫ • СНЕГОПАДЫ

Наводнения на Дальнем Востоке и в Китае



Снимки из космоса бассейна реки Амур, сделанные в августе 2008 и 2013 г.



Сотни населенных пунктов Амурской области и Хабаровского края оказались в зоне затопления.

С конца июля 2013 г. юг Дальнего Востока России и северо-восток Китая оказались подвержены катастрофическим наводнениям, которые были вызваны интенсивными затяжными осадками, приведшими к увеличению уровня воды в реке Амур.

В России наиболее пострадавшими регионами стали

Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Только для сельского хозяйства ущерб составил не менее 10 млрд рублей.

На пике паводка, 3 и 4 сентября, расход воды в Амуре достигал 46 тысяч м³/с (при норме в 18-20 тыс. м³/с). Наводнение таких масштабов произошло впервые за 115

лет наблюдений, и, согласно расчетам, вероятная частота повторения такого события — один раз в 200-300 лет.

В Амурской области и Хабаровском крае было подтоплено 203 населенных пункта в 24 муниципальных образованиях. Пострадало свыше 11 тыс. жилых домов с населением 72 тыс. человек. Также за-

топлению подверглись около 24 тыс. дачных, приусадебных участков и огородов. С момента начала эвакуационных мероприятий оказана помощь почти 135 тыс. человек.

В Благовещенске пик паводка был пройден 16 августа, когда уровень Амура достиг 822 см. Вода начала спадать с 19 августа.


Наводнения в Индии

Наводнения в Индии в июне 2013 г. затронули штаты Химачал-Прадеш и Уттаракханд (регионы Кумаон, Гархвал, местности Тера и Бхабхар у подножья Гималаев). Кроме того, от них пострадал западный Непал (регионы Доти, Хумла и пр.), а также другие регионы Индии — Харьяна, Дели и Уттар-Прадеш.

На севере Индии с 16 июня начались проливные дожди. Вода хлынула с гор в каньоны, образуя бурлящие потоки, сметавшие поселения и храмы. В горах расположен ряд индийских святынь, к которым приходят тысячи паломников. Из 5748 человек, объявленных в штате Уттар-Прадеш пропавшими без вести, а затем погибшими, только 900 были местными жителями. Позже дожди вызвали наводнение на равнине. Военные Индии провели спецоперацию, названную одной из самых массовых в мире. За неделю из затопленных районов были вывезены более 100 тыс. человек. После наводнения остро всталася проблема эпидемий. Территория обрабатывалася хлорной известью, а в горные деревни направлялись отряды врачей.



▲ Статуя бога Шивы в городе Ришикеш противостоит разлившимся водам реки Ганг.



▼ Бушующие горные потоки.



КНИГИ! Узнайте подробнее на стр. 32-33

СУПЕРТАЙФУНЫ • НАВОДНЕНИЯ • ПОЖАРЫ • СНЕГОПАДЫ

Наводнения в Европе

Наводнения в Европе начались после нескольких дней проливных дождей в конце мая — начале июня 2013 г. Они затронули преимущественно север и восток Германии, Чехию, Австрию, Польшу, Венгрию. Швейцария, Словакия и Беларусь подверглись затоплению в меньшей степени. Паводок распространился вниз по течению Эльбы, Дуная и в бассейне их притоков. Из-за сильных дождей улицы нескольких городов в Наварре (Испания) превратились в бурные потоки. В Хорватии был введен режим чрезвычайной ситуации. В экстренном режиме к наводнениям подготовились Сербия и Румыния. Также затопило юго-восток Бельгии, север Болгарии и Украину (Одесская область, Крым, запад страны). Общее число жертв составило не менее 24 человек.



Шторм «Святой Иуда»

В конце октября на ряд областей Великобритании, Франции и Нидерландов обрушился мощный шторм «Святой Иуда». Шторм сопровождался ураганными ветрами и ливневыми дождями. В радиусе его действия скорость ветра колебалась от 130 до 160 км/час.

Непогода послужила причиной серьезных перебоев в работе ряда крупных аэропортов. В некоторых районах упомянутых стран нарушилось железнодорожное сообщение, в Великобритании на некоторое время была парализована работа морского порта Дувр. По сообщениям британской газеты The Guardian, в связи со штормом было принято решение временно отключить два ядерных реактора на АЭС «Дангенесс» в графстве Кент.

Жертвами шторма стали как минимум 13 человек. Более 300 тыс. домов в северной части Европы остались без электричества.



▲ Волны разбиваются о маяк во время шторма, который обрушился на Великобританию 28 октября. Нью-Хейвен, юго-восточная Англия.

Лесной пожар в регионе Мидоубэнк подбирается к поселку Хэмилтон на острове Тасмания 4 января 2013 г.



Январь 2013 г. в Австралии стал самым жарким месяцем за все время наблюдений. 18 января в Сиднее зарегистрирован новый температурный рекорд — 45,8° выше нуля по Цельсию. Тысячи жителей искали прохлады в волнах океана.

Вслед за аномальной жарой на континент пришли лесные пожары, уничтожившие десятки домов и сотни гектаров леса. Сотрудники пожарных служб признаются, что пожары этого года — одни из самых опасных за последние 30 лет, так как они распространялись

с «пугающей скоростью».

В Австралии ежегодно пожароопасный сезон начинался в декабре, когда в стране наступало лето. Теперь леса за полыхали с середины октября. Власти выдвинули предположение, что сухостой подожгли военные во время учений. Из-за сильного ветра пожары быстро превращались в огненную стену, надвигающуюся на города и поселки. В некоторых населенных пунктах целые улицы превратились в горы обугленных головешек. В борьбе с огнем участвовало свыше 1,5 тыс. пожарных.

Пожары в Калифорнии



В конце августа жаркая погода и мощный ветер стали причинами лесных пожаров в американском штате Калифорния. От огня сильно пострадал знаменитый Йосемитский национальный парк. Пожарные пытались не подпустить огонь к поселениям. Однако ту-

шить пламя было трудно из-за пересеченной местности. Пожар уничтожил вековые сосны и секвойядендроны — гигантские секвойи, растущие на скалистых холмах. Пепел от пожарищ загрязнил водоемы, из которых снабжаются водой Сан-Франциско и окрестности.

СУПЕРТАЙФУНЫ • НАВОДНЕНИЯ • ПОЖАРЫ • СНЕГОПАДЫ

Поздняя весна в Европе

В связи с осложнением погодных условий (интенсивный снегопад, метель, заносы), в столице Украины 22 марта была объявлена чрезвычайная ситуация. За сутки в Киеве выпало 50 мм осадков (при месячной норме 47 мм). К вечеру в некоторых местах высота снежного покрова выросла до метра. В ночь с пятницы на субботу тысячи автомобилистов вынуждены были ночевать в своих машинах, застрявших на улицах в многокилометровых заторах.

После начала метели в Киеве наступил транспортный коллапс. Вечером 22 марта люди добирались домой

8-12 часов. Движение наземного транспорта было фактически остановлено. Всего же во время прохождения циклона над Киевской областью выпало 60 мм осадков. Был побит суточный максимум осадков для марта, принадлежавший 1937 году — тогда их выпало 43 мм, но в виде дождя.

Утром 26 марта, по данным метеослужбы аэропорта Жуляны, температура воздуха упала до -13 °C, что на 1,6 °C ниже предыдущего рекорда 1886 г. В целом же март 2013 г. в Киеве стал самым влажным за всю историю наблюдений: в течение него выпало 112 мм осадков, что заметно выше рекорда 1966 года (100 мм).



Заснеженное Средиземноморье

В то время как Европа переживает, пожалуй, наиболее теплый декабрь за всю историю наблюдений (даже на самом севере континента температура почти не опускается ниже нулевой отметки), жители Ближнего Востока и Северной Африки стали свидетелями небывалых снежных бурь. Снег ненадолго укрыл даже знаменитые египетские пирамиды, чего не случалось на протяжении всего XX столетия. Свою «белую пятницу» пережил Иерусалим, где 13 декабря толщина снежного покрова местами достигла полуметра. Город на некоторое время оказался полностью отрезанным от внешнего мира. Кроме Израиля, от снегопадов пострадали также его соседи — Ливан, Иордания и Сирия; на побережье Средиземного моря в это же время прошли мощные ливни. На отдельных участках (главным образом на возвышенностях) снег задержался на достаточно длительное время, «дождавшись» чистого неба, когда появилась возможность сфо-



тографировать заснеженные территории с помощью космических аппаратов — в частности, спутника Terra (NASA) и его спектрорадиометра среднего разрешения MODIS, на основании данных которого, полученных 15 декабря 2013 г., было построено приведенное изображение.

Прорыв арктических воздушных масс в тропические широты, несомненно, будет отнесен к многочисленным погодным аномалиям, которые мы уже имели возможность наблюдать в ушедшем году. Все они полностью укладываются в прогнозы метеорологов о том, что по мере



EOSDIS Worldview at NASA GSFC

потепления климата значительная часть областей нашей планеты начнет испытывать

все более сильные и частые отклонения от обычного для них «погодного режима».

Снегопады в Америке

Aномальные снегопады, засыпавшие накануне центральные и западные штаты США, 26 ноября 2013 г. двинулись в сторону Атлантического побережья. На следующий день непогода обрушилась на Нью-Йорк...

Снежные заносы в центральных и западных штатах США стали причиной гибели более десятка человек. Смер-

тельные случаи зафиксированы в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико, Оклахоме и Техасе.

В некоторых штатах выпало до 30 см снега, а температура упала сразу на 10 градусов. Как сообщал ранее корреспондент «Голоса России» в США, все американские авиакомпании выпустили предупреждения для пассажиров: если они собираются до-

мой на День благодарения — нужно сообщить родным о том, что они опаздывают.

24 ноября были отменены 300 рейсов в международном аэропорту Даллас в Техасе. Кроме того, отменялись также авиаарейсы, проходившие над регионами, где бушевал снежный шторм. В районе Феникса — столицы штата Аризона — выпало около 40 см снега.

Торнадо над Оклахомой

Tри четверти торнадо на планете зарождаются на территории Северной Америки, главным образом — в центральных штатах США. Этот регион даже называют «Аллеей торнадо». Его обитателям уже не впервые приходится прятаться от разрушительных смерчей в специально оборудованных подземных укрытиях. Однако даже самые «привычные» жители штата Оклахома не смогли припомнить ничего подобного тому, что они увидели 20 мая 2013 г. Энергия торнадо, «навестившего» штат в этот день, примерно в 600 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. По специальной шкале Фудзито этому явлению была присвоена высшая категория — F5. В описании указа-




но, что такие торнадо сносят фундаменты прочных домов, перенося здания на большие расстояния, срывают асфальт и поднимают в воздух автомобили.

Атмосферный вихрь сформировался к западу от города Ньюкастла, затем, пройдя несколько километров, достиг города Мура (пригорода Оклахома-сити), пересек его центр и ушел в небо над озером Стэнли Дрэпер. Длина пути торнадо составила около 20 км, ширина — 2 км. В этой полосе практически все здания оказались разрушенными, полностью нарушилось электроснабжение, сильно пострадали наземные коммуникации. Жертвами стихии стали 24 человека, в том числе 10 детей. Около трехсот человек получили травмы.



Торнадо над Оклахомой
20 мая 2013 г.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ. Библиотека журнала «Вселенная, пространство, время» + Новинки в честь десятилетия журнала



новинка!

новинка!

КОСМОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ

Рождение нового мировоззрения
Сборник статей

ЗВЕЗДОЛЕТЫ, МОНСТРЫ И КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ
Пауль Госсен
Сборник фантастических рассказов

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
www.shop.universemagazine.com

Заказ на все виды продукции можно оформить: • в Интернет-магазине www.shop.universemagazine.com
• почтой по адресу: 02152, Киев, Днепровская набережная, 1А, оф.146 • по телефону (067) 370-60-39.

Оплата на сайте при оформлении заказа, в любом отделении банка, через терминалы i-box или на почте при получении.
Доставка по Украине осуществляется Укрпочтой, Новой почтой, по Киеву — бесплатно (при заказе от 300 грн.)